

分布：中国台湾；印度东北部，越南，泰国，斯里兰卡，马来西亚，印度尼西亚。

(34) 斑始青尺蛾 *Herochroma crassipunctata* (Alphéraky, 1888) (图版IV: 3, 4)

Gnophos crassipunctata Alphéraky, 1888, *Stettin. ent. Ztg.*, **49**: 68. Lectotype♂, Askai. (ZIS)

Archaeobalbis crassipunctata: Prout, 1912: in Wytsman, *Genera Insectorum*, **129**: 25.

Archaeobalbis sordida Wehrli, 1928, *Int. ent. Z.*, **21** (46): 455. Holotype♂, [China]: East Turkestan, Yarkand, Mustagata.

头顶浅橄榄灰色。胸腹部背面颜色同翅面。腹部背面有立毛簇。其他特征未知。

前翅长：♂23—25 mm。翅浅灰色，散布褐色鳞片。前翅内线黑褐色，细弱波状；外线黑褐色，锯齿形，在脉间常断离，其外侧伴有1灰白色带；亚缘线模糊，为脉间褐色小斑块，缘线清晰，在翅脉端有间断。后翅外线、亚缘线和缘线同前翅。前后翅中点大，灰黑色。翅反面：灰白色散布褐色鳞片；中点大而圆、黑色，较正面清晰。

♂外生殖器（据 Inoue, 1999）：钩形突短小，近三角形。背兜侧突细长，杆状。抱器瓣端部圆，抱器背基部凸出，抱器瓣近端部1/3处向前端延伸成三角形骨化带；抱器腹具小端突。横带片具1对骨化突。囊形突略凸出。阴茎中部具1尖齿。

♀外生殖器（据 Inoue, 1999）：后阴片边缘不清晰，褶皱、骨化；前阴片为1对侧骨化片。囊导管很短，骨化、褶皱。囊体长，头端较细，近中部具1小袋状突。

检视标本：ZFMK: 1♂, Tadzikistan, 1978, L, Fl. Vantsh, Gumajak, 2000 m, 5-7. VI, Raitviir, Metsaviir & Viidalepp leg, Museum A. Koenig; 1♂, holotype of *Archaeobalbis sordida*, Mustagata, Yarkend.

分布：新疆；土耳其斯坦，塔吉克斯坦，阿富汗。

(35) 冠始青尺蛾 *Herochroma cristata* (Warren, 1894)

Actenochroma cristata Warren, 1894a, *Novit. zool.*, **1**: 381. Lectotype♂, Bhotan [Bhutan]; [India]: Sikkim; Celebes (south) [Sulawesi]. (BMNH)

Actenochroma subopalina Warren, 1894a, *Novit. zool.*, **1**: 382.

Pseudoterpna subtepens (part) Hampson, 1895b, *Fauna Br. India* (Moths), **3**: 479. (nec Walker, 1860)

Archaeobalbis subtepens (part) Prout, 1912, in Wytsman, *Genera Insectorum*, **129**: 25. (nec Walker, 1860)

Archaeobalbis cristata: Prout, 1930a, *Bull. Hill Mus. Witley*, **4**: 127.

Archaeobalbis cristata ab. *subopalina*: Prout, 1932, in Seitz, *Macrolepid. World*, **12**: 46.

Herochroma cristata: Holloway, 1996, *Malay. Nat. J.*, **49** (3—4): 199.

分布：台湾、海南、广西、四川；印度，不丹，尼泊尔，越南北部，泰国，印度尼