

BMNH: 1♂, holotype, Khasis, Nat. Coll., 1905-65 (*Actenochroma ochreipicta* Swinhoe♂ type; red type label; BMNH slide NO. 11700); 1♀, India, Simla, 7000 ft, A. E. Jones, B. M. 1931-101; 1♂, Gopaldhara, Darjeeling, 3440—5800' (H. Stevens), Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Darjeeling, Dr. Lidderdale, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Sikkim, 18. 5. 1888, O. Möller, Collectio H. J. Elwes, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Khasis, Feb. 1894, Nat. Coll., Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (*Actenochroma viridaria* Moore); 1♂, Khasia Hills Assam, Tr. Mus. Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Tsékou, 1900, R. P. J. Dubernard, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3.

**分布:** 福建、台湾、海南、广西、云南; 印度北部, 尼泊尔, 越南北部。

**备考:** 和 Inoue (1999) 的描述相比, 广西和福建的标本的钩形突较尖, 横带片突的边缘有不规则的小齿。后足胫节端突明显短于第 1 跗节的 1/2, 与 Inoue 描述的为第 1 跗节的 1/2 有所不同。因为目前没有发现其他的区别和足够的标本, 所以暂时认为这两个标本是本种。

(39) 淡色始青尺蛾 *Herochroma pallensia* Han et Xue, 2003 (图 102, 图 426, 图版 IV: 13, 14)

*Herochroma pallensia* Han et Xue, 2003, *Act. Ent. Sinica*, **46** (5): 632, figs. 3, 4, 12. Holotype ♂, China: Guangxi, Hunan, Fujian. (IZCAS)

♂额下半部暗绿色, 上半部黑褐色。下唇须尖端伸出额外, 腹面灰白, 侧面灰绿色。头顶、胸部背面灰绿色。腹部背面无毛簇。后足胫节端突略长于第 1 跗节的 1/2。♂第 3 腹节腹板有 1 对接合的刚毛斑。

前翅长: ♂21.5—23 mm。翅正面褪色, 新鲜标本应为暗绿色。前翅外缘微波曲; 2A 脉弯曲, 但不如弯脉始青尺蛾 *H. curvata* 弯曲强烈; 后缘弯曲; 前缘黑褐色杂红褐色; 未见内线; 黑色中点短条状; 外线直有锯齿; 亚缘线色浅不清晰; 缘线为翅脉间一系列的黑点。后翅中点圆形; 外缘锯齿形; 外线、亚缘线和缘线与前翅相似。翅反面: 翅基部散布污黄色; 两翅有黑色大中点; 端带宽阔、黑色, 不达外缘; 端带内侧污白色带少量黄色; 前翅端带外侧近前缘处带深赭红色; 缘线同翅正面。

♂外生殖器: 钩形突略延长, 端部浅凹陷。背兜侧突短粗, 基半部比端半部细。颚形突不发达, 中突小, 端部圆。抱器瓣宽大, 二裂形, 端部深凹陷; 抱器背细长, 抱器背基突三角形; 抱器腹较抱器背宽; 沿抱器背端突尖端向下至抱器瓣外缘, 再至抱器腹尖端, 再向后折至抱器腹外缘 1/2 处有 1 列小齿。横带片有 2 个舌状骨化片, 端部圆。囊形突扁平。味刷发达。阳茎细长, 阳茎鞘有 2 个刺状突。

♀外生殖器：未知。

**检视标本：**IZCAS：1♂，正模，广西龙胜，1980. VI. 13，王林瑶采；1♂，副模，广西龙胜，1980. VI. 10，宋士美采；1♂，湖南莽山，1981. VII. 8；1♂，福建三港，1980. VIII. 12；1♂，广西桂林，1980. VI. 7，宋士美采。

**分布：**湖南、福建、广西。

(40) 宏始青尺蛾 *Herochroma perspicillata* Han et Xue, 2003 (图 103, 图 427, 图版 IV: 15, 图版 V: 1)

*Herochroma perspicillata* Han et Xue, 2003, *Act. Ent. Sinica*, **46** (5): 636, figs. 5, 6, 13. Holotype♂, China: Yunnan. (IZCAS)

额灰黄褐色，有灰黑色横带。头顶污白色。胸部背面灰绿色。腹部背面颜色较翅面色稍浅，第3—4节有明显立毛簇。后足胫节略膨大，无端突。♂第3腹节腹板具1对刚毛斑。

前翅长：♂25.5 mm。前翅外缘微波曲，后翅外缘锯齿形。前后翅中点黑色。前翅内线有两个大齿；外线锯齿小，在CuA<sub>1</sub>下方内弯，外侧伴随污白色线；亚缘线锯齿形，污白色；外线和亚缘线间有黑褐色碎斑；缘线为翅脉间1列黑点。后翅外线基本同前翅；亚缘线齿较前翅小；缘线黑色，几乎连续，但在翅脉间加粗。翅反面：翅基部白色，带污黄色调；有黑色大中点；端带宽阔灰黑色，前翅端带达外缘，向外色渐浅，后翅端带不达外缘。

♂外生殖器：钩形突粗壮，端部平，中间微凹陷，向两侧强烈扩展。背兜侧突中部肘状弯曲，端半部宽度约为基半部的2倍。颚形突具端部较钝有微刺的中突。抱器瓣基部宽阔，端部尖；抱器背膨大，无突；抱器腹中部具强骨化突，端部有褶皱；抱器腹端突圆。横带片有细长杆状侧突。囊形突半圆形凸出。味刷发达。阳茎鞘具钝粗骨化突。

♀外生殖器：未知。

**检视标本：**IZCAS：1♂，正模，云南屏边大围山，1500 m，1956. VI. 18，黄克仁等采。

**分布：**云南。

(41) 玫始青尺蛾 *Herochroma rosulata* Han et Xue, 2003 (图 104, 图 428, 图 730, 图版 V: 2, 3)

*Herochroma rosulata* Han et Xue, 2003, *Act. Ent. Sinica*, **46** (5): 637, figs. 9, 10, 15, 16. Holotype♂, China: Hainan. (IZCAS)