

外缘锯齿形，在 CuA<sub>2</sub> 端的齿大，使外缘中部显得凹陷；外线黑色锯齿形。前后翅中点小，黑色；亚缘线、缘线为翅脉间一系列黑点。翅反面：前后翅均有大而圆的黑色中点；翅基部橘黄色杂有黑色碎点，前翅基部近后缘处为白色；后翅后缘中部有 1 大块黑色斑块；前后翅端部为宽阔的黑褐色端带，达外缘，前翅顶角和后翅臀角颜色较浅。

♂外生殖器：钩形突为简单凸起，细长，长度约为背兜侧突的 1/3。背兜侧突粗壮，中部的折角凸起较小。颚形突中突骨化强，三角形，尖，上有微刺。抱器瓣结构简单，端部圆；抱器腹基中部内侧有 1 小齿，外缘光滑。横带片有基部和侧面 2 对凸起，其中，基部凸起较短，侧面凸起细长，凸起上有微刺。囊形突略凸出。有味刷。阳茎细长，端部骨化，阳茎鞘中部有 1 大三角形凸起，上有小齿。

♀外生殖器：交配孔周围强骨化，具 1 对发达骨化圆钝侧突；后阴片不清晰，骨化，具横向褶皱。囊导管短，骨化。囊体内有囊片，具 2 个尖齿。

检视标本：IZCAS：1♂，浙江泰顺乌岩岭双坑口，680 m，2005. VII. 28，郎嵩云采；2♀♀，福建三港，1980. IX. 17，江凡采；♂，海南尖峰岭天池，1980. IV. 12—16，张宝林采；1♂，同前，1980. IV. 14，蔡荣权采；1♂，海南尖峰岭，1981. VI. 26，顾茂彬采；1♂，同前，1982. V. 7，林允洞采；1♂，广西那坡德孚，1350 m，2000. VI. 19，李文柱采；1♂，广西金秀罗香，200 m，1999. V. 15，韩红香采；1♂，广西金秀林海山庄，1000 m，2000. VII. 2，李文柱采；1♂，广西防城扶隆，500 m，1999. V. 25，袁德成采；1♂，同前，1999. V. 24，张彦周采；1♂1♀，广西上思红旗林场，300—350 m，1999. V. 29，李文柱采；1♂，同前，1999. V. 28，袁德成采；1♂，广西龙州弄岗，330 m，2000. VI. 15，姚建采；1♂，广西大明山天平，1200 m，1984. VI. 16，采集人不详。

SYSU：1♂，广东信宜大雾岭，2002. V. 29，谢委才采。

BMNH：1♂，paratype，PHANG，F. M. S. Cameron Highlands，4800 ft，25. 6. 1935 (with red type label) .

ZFMK：2♂♂，S O. Szechuan [SE Sichuan]：Kr. Nanchuan：Ginfu-Shan，1929. IX，Coll. Friedrich.

ZSM：1♂，holotype，West Malaysia Cameron Highlands，Strawberry Park，21. VI. 1988，C. Herbulot.

分布：浙江、福建、广东、海南、广西、四川；越南，泰国，马来西亚。

(46) 克始青尺蛾 *Herochroma yazakii* Inoue, 1999 (图 109, 图 433, 图版 V: 12)

*Herochroma yazakii* Inoue, 1999, *Tinea*, **16** (2): 78—79. figs 5, 6, 60, 87. Holotype♂, Nepal: Kathmandu: Godavari.

*Archaeobalbis viridaria* Yazaki, 1992, in Haruta, *Tinea*, **13** (Suppl. 2): 6, pl. 2: 10. (nec



Moore, 1868)

额凸出，上缘有1条黑褐色横带。下唇须短但十分粗壮，背面深褐色，腹面灰黄色，第2节腹面中部掺杂深褐色。头和体背灰绿色，腹面多毛。♂后足胫节端突达第1跗节的1/2。♂第3腹节腹板具1对接合的刚毛斑。

前翅长：♂23.5—25 mm。翅面黄绿色，略带灰绿色调。前翅外缘微波曲。后翅宽大，臀角凸出，外缘深锯齿形。前翅内线和前后翅外线均锯齿形，黑紫色；内线内侧和外线外侧伴随紫色模糊带；前后翅中点黑色，小而清晰；无明显亚缘线；缘线为翅脉间1列黑点；缘毛灰黄色，其基部在翅脉端有1微小黑点。翅反面灰黄至浅黄褐色，散布黑灰色鳞，前翅前缘附近和后翅前缘基部带紫红或红褐色调；前翅中点圆形，巨大，其直径可达2 mm以上，后翅中点较小；外线处为1黑灰色端带，其外缘模糊，未达外缘，其上端在前翅近前缘处散布紫红色。

♂外生殖器：钩形突尖端1/3为二分裂状。背兜侧突发达，基半部粗壮，端半部较细，中部为1近直角的折角。颚形突中突尖三角形，上有微刺。抱器瓣基部较窄，端部宽阔，中部膜质；抱器背基突弯曲细长，极尖；抱器背端部膨大，边缘有浓密的骨化微刺；抱器腹平直，抱器腹端突三角形。横带片具1对侧突，短粗，尖端细。囊形突扁平。有味刷。阳茎细长，阳茎鞘有骨化刺状突。

♀外生殖器（据Inoue, 1999）：前阴片具1对强骨化的带。囊导管在端半部骨化。囊体内有囊片，两端有刺。

检视标本：IZCAS：1♂，四川灌县青城山，700—1600 m，1979. VI. 3，高平采；1♂，同前，1979. VI. 4，尚进文；1♂，四川渡口烂木桥，1980. VIII. 22，张宝林采；1♂，四川丰都世坪，610 m，1994. X. 5，宋士美采；1♂，四川万县王二包，1200 m，1994. V. 27，李文柱采；1♂，云南腾冲大蒿坪，2020 m，1992. V. 24—26，薛大勇采；1♂，云南？屯冲旧山关坡，1740 m，1979. IV. 8。

分布：四川、重庆、云南；印度，尼泊尔，泰国。

## 10. 巨青尺蛾属 *Limbatochlamys* Rothschild, 1894

*Limbatochlamys* Rothschild, 1894, *Novit. zool.*, 1: 540. **Type species:** *Limbatochlamys rosthorni* Rothschild, 1894, by original designation. [CHINA]: Interior of China.

头胸腹部：♂♀触角均短双栉形，♀栉齿短于♂。额中度突出，粗糙。下唇须第2节具粗糙鳞片，第3节短小。胸部腹面和腿节多毛。后足胫节不膨大，2对距。腹部背面无立毛簇。♂第3腹节腹板无刚毛斑。

翅：前翅顶角尖，略呈钩状；后翅顶角圆；前后翅外缘光滑；后翅后缘延长。前翅