

前翅长：♀ 15 mm。前翅顶角钝，后翅顶角圆；两翅外缘浅波曲，后翅外缘中部有尾突。翅灰色，带灰黄绿色，外线外侧颜色较浅。前翅内线模糊不清；外线白色，细弱，较直。后翅外线较接近外缘，几乎和外缘平行，略呈锯齿形。两翅中室端脉加深呈线状中点；无缘线；缘毛灰色。翅反面颜色较正面浅，可见正面斑纹。

♂外生殖器：钩形突骨化，细长，向尖端渐细。背兜侧突膜质，与钩形突长度相当。颚形突中突弱骨化，细长。抱器瓣端部钝圆；抱器背前缘中部略凸出，腹缘近中部具1发达耳状突；抱器腹端部钝，长度约为抱器瓣长的1/2。阳端基环为1发达叉状骨片。囊形突短宽，中部略凹，具1发达指状突。味刷弱小。阳茎骨化，端部2/3粗壮；阳茎盲囊特别细长，长度达阳茎的1/3。

♀外生殖器：前表皮突短小，后表皮突细长。后阴片骨化，形状不清晰。囊导管强骨化。囊体近球形，在囊颈附近弱骨化，囊片为1简单凸起。

检视标本：BMNH：1♀，holotype, Formosa: Rantaizan, 7500 ft, 7. V. 1909, A. E. Wileman (with red type label and original identifiical label); 2♀♀, same place and collector, 6. V. 1909, 14. V. 1909; 1♀, same place and collector, 27 May 1909, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1.

分布：中国台湾；日本。

备考：本种♂外生殖器来源于 Inoue 保存在英国自然历史博物馆的玻璃片，但没有记录该标本信息，故未出现在检视标本中。

(266) 亚突尾尺蛾 *Jodis subtractata* (Walker, 1863)

Thalera? *subtractata* Walker, 1863, *List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus.*, **26**: 1753. Holotype ♀, [India]: Hindostan. (BMNH)

Jodis subtractata: Prout, 1934, in Seitz, *Macrolepid. World*, **12**: 125, pl. 14d.

Jodis subtractata: Holloway, 1996, *Malay. Nat. J.*, **49** (3—4): 284.

分布：海南；印度（北部、安达曼群岛、锡金），缅甸，喜马拉雅山东北部，菲律宾（吕宋），马来西亚（沙捞越），文莱，印度尼西亚（巴厘岛、加里曼丹岛、苏门答腊岛）。

本种已记载2个亚种，中国分布指名亚种。马来西亚、印度尼西亚、文莱分布亚种 *subsp. accumulata* Prout。

亚突尾尺蛾指名亚种 *Jodis subtractata subtractata* (Walker, 1863) (图 307, 图 627, 图 859, 图版 XVII: 16)

♂触角近1/2双栉形，栉齿紧贴触角干，端部线形；♀线形带纤毛。额不凸出，灰绿色。下唇须黄褐色，细弱，♂尖端、♀1/3伸出额外，♀第3节延长，短于第2节。

头顶前半部白色，后半部灰黄绿色。胸腹部背面淡灰绿色，无立毛簇。♂后足胫节膨大，有毛束和短端突；♂♀2对距。♂第3腹节腹板具中部刚毛斑。♂第8腹节基本不特化。

前翅长：♂♀10—11.5 mm。前翅顶角钝，后翅顶角圆；两翅外缘略波曲，后翅外缘中部有尾突。翅暗灰绿色，有黄绿色斑纹；白色内线细弱模糊，外侧有宽阔深色伴带；外线白色，不规则锯齿形，较接近外缘，内侧有宽阔深色伴带，后翅外线中部凸出；两翅中点灰绿色，窄带状；无缘线；缘毛灰黄绿色。翅反面灰色，无斑纹。

♂外生殖器：钩形突骨化，细长刺状。背兜侧突膜质，长度约为钩形突的一半。颚形突中突窄舌状，弱骨化。抱器瓣狭长，向端部渐窄；抱器瓣背缘略弯曲，腹缘弧形弯曲；抱器瓣基部有狭窄弧形凹槽，不达腹缘。横带片膜质、带状。囊形突半圆形，无中突。阳茎中部增粗，端半部骨化；阳茎盲囊细长。

♀外生殖器：前后表皮突均短小细弱，后表皮突约为前表皮突的1.5倍。囊导管弱骨化，上粗下细，略短于囊体直径。囊体球形，囊颈处骨化，内有1近心形囊片。

寄主：桃金娘科 Myrtaceae：小莲雾 *Eugenia aquea*；无患子科 Sapindaceae：龙眼 *Dimocarpus longan*、红毛丹 *Nephelium lappaceum*、野红毛丹 *Nephelium mutabile*。

检视标本：BMNH：1♂，holotype，Hindustan；1♂，Naga hills，5500—7000 ft，Aug. 1889，W. Doherty，Collectio H. J. Elwes，Rothschild Bequest，B. M. 1939-1 (BMNH slide NO. 17329)；1♀，Montalban，prov. Rizal，Luzon，3. II. 1914，A. E. Wileman，Wileman Coll. B. M. 1929-261；1♂，*ibidem*，25. I. 1914；1♀，Sikhim，Rothschild Bequest，B. M. 1939-1。

分布：海南；印度（北部、安达曼群岛、锡金），缅甸，喜马拉雅山东北部，菲律宾（吕宋）。

(267) 西藏突尾尺蛾 *Jodis tibetana* Chu, 1982 (图版 XVII: 17)

Jodis tibetana Chu, 1982, in Chen *et al.*, *Insects of Xizang*, 2: 108, fig. 3. Holotype ♀, China: Xizang (Tibet), Gyirong Tudan. (IZCAS)

原始描述：前翅长 14—15 mm，青灰色有闪光，外线白色，外线以内较灰黄，后翅也如此；前后翅中室上有 1 灰白点，有些标本此点不清楚；翅反面色泽与正面大致相同；头、身均白粉色略灰。

此种与 *J. xynia* Prout（分布于印度）极相似，但外线曲度不同；中室上有 1 白点。

♂♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS：1♀，正模，西藏吉隆托当，3300 m，1975. VIII. 2，王子清采；1♀，副模，西藏吉隆托当，3300 m，1975. VIII. 4，王子清采。