

BMNH: 1♂, holotype, Cheng-Mei, Hainan, July 1902, Rothschild Bequests, B. M. 1939-1 (BMNH slide NO. 17483, with red type label); 2♀♀, *ibidem*; 1♀, Mt. Wuchi, Hainan, May 1903, Rothschild Bequests, B. M. 1939-1; 1♂, Hongkong (Tony: G1).

分布: 海南、香港、四川。

(271) 谬尖尾尺蛾 *Maxates acyra* (Prout, 1935) (图 310, 图 630, 图版 XVII: 21)

*Hemistola acyra* Prout, 1935, in Seitz, *Macrolepid. World*, 4 (Suppl.): 20, pl. 3e. Syntypes 4♂♂, Mt Omei. (BMNH)

*Maxates acyra*: Han et Xue, 2009, *Entomological Science*, 12 (3): 409.

♂触角双栉形, 栉齿长度约为触角干直径的 2.5 倍, 尖端纤毛状。额黑褐色。下唇须鳞片粗糙, 黑褐色, 约 1/4 伸出额外。头顶前半部白色, 后半部灰绿色。胸腹部背面灰绿色。♂后足胫节膨大、有毛束、2 对距。♂第 3 腹节腹板具 1 对刚毛斑。♂第 8 腹节无特化。

前翅长: ♂ 12 mm。前翅顶角尖; 外缘浅弧形; 后翅顶角圆滑; 外缘在  $M_3$  脉端凸出 1 尖角。翅面灰绿色, 带黄绿色调。前翅前缘黄褐色, 散布黑色鳞片; 内线几乎不可见; 外线极细弱白色, 浅锯齿形, 不清晰, 内侧暗绿色; 中点灰绿色; 缘线黑褐色, 在翅脉端有微小白点; 缘毛灰褐色, 在翅脉端色深。后翅中点暗绿色; 外线和缘线同前翅, 缘毛和前翅相同, 但多白色。翅反面淡灰绿色, 无斑纹。

♂外生殖器: 钩形突向尖端渐细。背兜侧突膜质, 略长于钩形突的 1/2。颞形突中突扁舌状。抱器瓣大部分膜质, 端部钝圆; 抱器背略呈弓形; 抱器瓣腹缘耳状突大, 且较尖, 其下方深凹陷; 抱器腹弱骨化, 其端部向抱器瓣内延伸成 1 片状端突, 具齿。横带片不特化。囊形突狭小, 长宽相近。味刷微弱。阳茎纤细弯曲, 端部骨化。

♀外生殖器: 未知。

检视标本: IZCAS: 11♂♂, 四川峨眉山清音阁, 800—1000 m, 1957. IV. 21—VII. 25, 黄克仁、朱复兴采。

BMNH: 1♂, syntype, Mt. Omei 4000—4500 ft, 22. VIII. 1929, Szechuan, M. Franck, L. B. Prout Coll. B. M. 1939-643 (Seitz Suppl. IV: p. 20, 1935); 1♂, syntype, *ibidem*, 30. VII. 1929 (BMNH slide NO. 21710); 1♂, syntype, *ibidem*, 31. VIII. 1929, Joicey Bequest, Brit. Mus. 1934-120; 1♂, syntype, *ibidem*, 22. VIII. 1929, Szechuan, M. Franck.

分布: 四川。