

A. C. Galsworthy; 1 ♀, Ma On Shan, Hong Kong, 16.10.96, G. Reels, BMNH (E) 1998-126.

分布：中国香港。

(278) 锯翅尖尾尺蛾 *Maxates coelataria* (Walker, 1861) (图 317, 图 637, 图版 XVII: 30, 31)

Thalassodes coelataria Walker, 1861, *List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus.*, **22**: 552. Holotype ♂, Ceylon [Sri Lanka]. (BMNH)

Maxates coelataria: Prout, 1912, in Wytsman, *Genera Insectorum*, **129**: 163.

Maxates coelataria trychera Prout, 1933, in Seitz, *Macrolepid. World*, **12**: 111, pl. 13f. Syntype(s), India: Khasi Hills. (BMNH)

别名：锯翅青尺蛾。

♂ 触角基部 2/3 双栉形，外侧栉齿略长于内侧，最长栉齿约为触角干直径的 6 倍，其余部分线形；♀ 线形。额深灰绿色。下唇须约 1/2 伸出额外。头顶污白色，后缘灰绿色。胸腹部背面草绿色。♂ 后足胫节膨大，有毛束，2 对距。♂ 第 3 腹节腹板具 1 对刚毛斑。♂ 第 8 腹节腹板边缘弱骨化，略凹陷。

前翅长：♂ 19 mm。前翅外缘锯齿形，在 M_1 — M_3 脉间凹陷较深；后翅外缘在翅脉端均有凸出，在 M_3 脉端凸出大，脉间凹陷。翅面草绿色。前翅前缘具宽阔的污黄色带，缀有少量黑色鳞片，略带粉色，其下缘端部 1/3 有褐边；臀角处具 1 淡褐色大斑，略带粉色，亦有少量黑色鳞片，大斑边缘有深褐色边；隐约可见锯齿形的内线和外线，极细，略带白色。后翅亦隐约可见纤细、略白的外线；在近前缘处形成 1 大白斑；在顶角和臀角均有略带粉色的淡褐色斑，上密布黑色鳞片。前后翅均可见颜色稍深的中点；缘线深褐色；缘毛短，灰白色杂褐色。翅反面：翅基部为污白色，前翅隐约可见中点；前后翅具宽阔深褐色端带，不达外缘；端带外侧具褐色鳞片。

♂ 外生殖器：钩形突细长，向尖端渐尖，末端小弯钩状。背兜侧突膜质、粗壮，略短于钩形突。颚形突中突扁宽。抱器瓣端部钝圆；抱器背中上部具 1 小膜质突；抱器瓣腹缘的耳状突端部具二叉状骨化齿，其下方深凹；抱器腹端部膨大，外缘圆滑，其端部中央具 1 骨化突。囊形突窄，略延长。有味刷。阴茎细长，端部骨化；阴茎盲囊短，端部略膨大呈球形。

♀ 外生殖器：未知。

生物学：幼虫圆柱形。

寄主：大戟科 Euphorbiaceae：银柴属 *Aporusa*。

检视标本：IZCAS：1 ♀，海南尖峰岭，1984. III. 7，刘元福采；1 ♂，广东海南琼中，400 m，1980. VII. 5，李贞富采。

SYSU: 1 ♀, Canton, South China, Honam Island, P'an-yu District, June 18, 1936, C. Ng.

BMNH: 1 ♂, holotype, Ceylon, 52.62 (green type label; Specimen photog for CHECKLIST AUST LEP, film 80/17; length of forewing 15 mm); 1 ♂, Ceylan [Ceylon], acq Doncaster, 1892, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; 1 ♂, syntype of *M. coelataria trychera*, Khasis, Feb. 1894, Nat. Coll., Rothschild Bequest B. M. 1939-1 (*Maxates coelataria trychera* Prout ♂ type; red type label); 1 ♂, same locality and date; 1 ♂, Khasia Hills, Assam, Nissary, Det. by L. B. Prout, Joicey Bequest, Brit. Mus. 1934-120; 1 ♂, Burma, Det. by L. B. Prout, Joicey Bequest Brit. Mus. 1934-120; 1 ♀, Taipinshi, Hainan, June 1906, Rothschild Bequest B. M. 1939-1; 2 ♂♂, Youboi, Hainan, June 1904, Rothschild Bequest B. M. 1939-1; 1 ♂, Sikkim, 1-4000 ft, Möller, Collectio H. J. Elwes, Rothschild Bequest B. M. 1939-1; 1 ♀, Sintang, Borneo, inland of Pontianak, Jan. 1910 (Dr. Martin), Rothschild Bequest B. M. 1939-1 (figured specimen, Moths of Borneo, Part 9); 1 ♂, Pulo Laut, Doherty, 96-34 (BMNH slide NO. 16796) (length of forewing 16—19 mm); 1 ♀, S. India, T. R. Bell, B. M. 1934-394 (BMNH slide NO. 17435); 1 ♀, Trevandrum, Travancore, 93-144, Sept. 1893. 1 ♀, Singapore, H. Roberts Coll. B. M. 1926-395.

ZFMK: 1 ♂, paratype, Khasis, Feb. 1894, Nat. Coll.

分布: 广东、海南; 印度, 缅甸, 越南, 斯里兰卡, 马来西亚, 新加坡, 印度尼西亚 (加里曼丹岛)。

(279) 小青尖尾尺蛾 *Maxates dissimulata* (Walker, 1861) (图 318, 图 638, 图版 XVII: 32)

Thalassodes dissimulata Walker, 1861, *List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus.*, **22**: 551. Holotype ♂, Hindostan [India]. (BMNH)

Thaleura marginata Warren, 1894a, *Novit. zool.*, **1**: 392. Holotype ♂, Bhutan. (BMNH)

Gelasma dissimulata: Prout, 1912, in Wytsman, *Genera Insectorum*, **129**: 147.

Gelasma semiprotrusa Inoue, 1989, *Bull. Fac. domest. Sci., Otsuma Wom. Univ.*, **25**: 266, figs. 31, 37. Holotype ♂, Taiwan: Nantou Hsien, Lushan Spa. **Syn. nov.** (BMNH)

Maxates dissimulata: Holloway, 1996, *Malay. Nat. J.*, **49** (3—4): 274.

♂ 触角基部 2/3 双栉形, 外侧栉齿长于内侧, 最长栉齿约为触角干直径的 4 倍。额黑褐色, 鳞片粗糙。下唇须背面黑褐色, 腹面白色, 尖端伸出额外。头顶大部分白色, 后缘灰绿色。胸腹部背面灰绿色。♂ 后足胫节膨大, 有毛束和短端突。