

绿色，模糊；外线白色，锯齿形，内侧伴有暗绿色；无缘线；缘毛灰绿色。后翅外线锯齿形，在中部凸出；中点、缘毛同前翅。翅反面色较正面浅，无斑纹。

♂外生殖器：钩形突强骨化，端部尖。背兜侧突几乎膜质，长度和钩形突相当。颚形突中突扁宽，边缘有小齿。抱器瓣大部分膜质；抱器背略凸出；抱器瓣腹缘中部偏上具1深凹陷，凹陷上方为大膜质耳状突，该突较细长，端部圆，位置较其他种近基部；抱器腹骨化，抱器腹端突发达，端部呈半圆形，腹面近端部处有极小刺，其外缘具1列齿。囊形突特别短小。味刷弱。阳茎短粗，端半部骨化，中部较粗，端部略细而尖；阳茎盲囊细长弯曲。

♀外生殖器：未知。

检视标本：BMNH：1♂，holotype，Kwanhsien，11. VII. 1930，M. Franck，L. B. Prout Coll.，B. M. 1939-643 (Seitz XIII：pl. 12f；BMNH slide NO. 8655)。

分布：四川。

(286) 绿尖尾尺蛾 *Maxates hemitheoides* (Prout, 1916) (图 324, 图 644, 图版 XVII: 38)

Gelasma hemitheoides Prout, 1916b, *Novit. zool.*, **23**: 206. Holotype ♂, [India]: Khasis [Khasi Hills]: Shillong. (BMNH)

Maxates hemitheoides: Holloway, 1996, *Malay. Nat. J.*, **49** (3—4): 274.

♂触角约 1/2 双栉形，最长栉齿约为触角干直径的 5 倍。额、下唇须棕色，头顶粉白色。♂后足胫节膨大，有毛束和端突。♂第 3 腹节腹板无刚毛斑。♂第 8 腹节腹板强骨化，为 2 个刀片状骨化大齿，齿上密布微刺。

前翅长：♂14 mm。前翅顶角略尖，外缘浅弧形；后翅顶角凸，外缘在 M_3 脉端凸出 1 小尖齿。翅灰绿色。前翅前缘黄色，散布黑褐色小斑点；内线白色波状。前后翅外缘白色锯齿形，在后翅中部外凸；中点较翅面颜色略深；缘线较翅面颜色略深，在翅脉端有清晰白点；缘毛灰绿色。翅反面无斑纹。

♂外生殖器：钩形突除端部尖外，粗细均匀。背兜侧突膜质，基粗端细。颚形突中突短扁，边缘弱骨化。抱器背中部弧形凸出，其下方中部之外有 1 道纵脊；抱器瓣腹缘近端部 1/3 处具 1 发达耳状突；抱器腹边缘直，略骨化，端部钝圆，与抱器瓣中部延伸出的 1 弧形骨化带相接，并有 1 朝向内折的骨化尖齿。囊形突半圆形。阳茎端半部骨化，中部膨大，向端部渐细；阳茎盲囊较短粗。

♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS：1♂，西藏聂拉木樟木，2250 m，1974. V. 19，张学忠采。

BMNH：1♂，holotype，Khasis，Nat. Coll.，Collectio H. J. Elwes，Rothschild Bequest，B. M. 1939-1 (*Gelasma hemitheoides* Prout, ♂，type；red type label；BMNH slide NO. 8654)；1♂，Khasis，Mar. 1891，Nat. Coll.，Rothschild Bequest，

B. M. 1939-1; 1♂, Khasis, Feb. 1894, Nat. Coll., Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (Seitz VII: pl. 11g); 1♂, Khasis, Mar. 1894, Nat. Coll., Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (with *griseoviridis* label); 1♂, Khasis, Nat. Coll., Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3 (with *griseoviridis* label); 1♂, Shillong, Assam, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (with *griseoviridis* label); 2♂♂, Shillong Assam, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Khasia Hills, Joicey Bequest, Brit. Mus. 1934-120.

分布：西藏；印度。

(287) 青尖尾尺蛾 *Maxates illiturata* (Walker, 1863) (图 325, 图 645, 图版 XVII: 39)

Thalassodes illiturata Walker, 1863, *List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus.*, **26**: 1563. Holotype♂, [China]: Shanghai. (BMNH)

Thalassodes dissimulata (part) Hampson, 1895b, *Fauna Br. India* (Moths), **3**: 512. (nec Walker, 1861)

Thalassodes grandificaria (part) Staudinger, 1901, in Staudinger & Rebel, *Cat. Lepid. palaeart. Faunengeb.*, **1**: 264. (nec Graeser, 1890)

Thalera grandificaria Wileman, 1911b, *Trans. ent. Soc. Lond.*, **1911**: 343. (nec Graeser, 1890)

Gelasma illiturata: Prout, 1912, in Wytsman, *Genera Insectorum*, **129**: 147.

Hemithea sasakii Matsumura, 1917, *Oyo-Konchu-Gaku*, **1**: 624, pl. 29, fig. 11. Syntype(s), [Japan]: [Honshu], Tohoku district.

Maxates illiturata: Holloway, 1996, *Malay. Nat. J.*, **49** (3—4): 274.

♂触角基部 3/4 双栉形，外侧栉齿长于内侧，端部 1/4 线形，最长栉齿约为触角干直径的 3 倍；♀线形。额黑褐色。下唇须黑褐色，尖端伸出额外。头顶前半部白色，后半部灰绿色。胸腹部背面灰绿色。♂后足胫节极膨大，有毛束和短端突，2 对距。♂第 3 腹节腹板中部具 1 对刚毛斑，中间有稀疏刚毛相连。第 8 腹节腹板弱骨化，腹板中部略凹陷，背板中部凸出。

前翅长：♂19—20 mm；♀21 mm。前翅顶角尖，外缘较直；后翅尾突延长，但较突缘尖尾尺蛾 *M. versicauda* 短。翅暗绿色，略带蓝绿色调。前翅前缘黄褐色，几乎不散布黑点，或零星有几个黑点；前翅内线细弱白色，浅弧形微波曲；前后翅中点墨绿色短条状；外线白色，深锯齿形，其内侧色较深；后翅外线中部外凸；无缘线；缘毛深灰褐或灰绿色，端部色浅。翅反面浅灰绿色，无斑纹。

♂外生殖器：钩形突较粗壮，尖端略细。背兜侧突膜质，略短于钩形突。颚形突中突扁舌状，光滑。抱器瓣大部膜质；抱器背基部隆起；抱器瓣腹缘中部凸出，弱骨化，凸出上端为凹陷，凹陷上部为小膜质耳状突；抱器腹端突发达，强骨化，向抱器瓣端部方向形成弯曲骨化突，端部尖，有密刺，近端部处有 1 向抱器背方向的尖刺，抱器腹端