

检视标本: BMNH: 1♂, holotype, Koshun, Formosa, Det. by L. B. Prout, Joicey Bequest, Brit. Mus. 1934-120 (with red type label, BMNH slide NO. 6048); 1♂, paratype (?), *ibidem*; 1♂, *ibidem* (无签); 3♂♂, Hori, Formosa, May 1935, L. B. Prout Coll. B. M. 1939-643, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Bukai, Formosa, VI. 15. 1934, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1.

ZFMK: 1♂, paratype, Koshun, Formosa (other labels: 610; *Gelasma versicauda* Prout, Paratype, ♂, det. D. S. Fletcher, 1962).

分布: 中国台湾。

(302) 缨尖尾尺蛾 *Maxates vinosifimbria* (Prout, 1935) (图 337, 图 656, 图版 XVIII: 16)

Gelasma vinosifimbria Prout, 1935, in Seitz, *Macrolepid. World*, 4 (Suppl.): 12, pl2g.

Holotype♂, Chinese Tibet, Ta-ho. (BMNH)

Maxates vinosifimbria: Holloway, 1996, *Malay. Nat. J.*, 49 (3—4): 274.

♂触角双栉形, 长度内外相当, 最长栉齿长度约为触角干直径的 6 倍, 尖端无栉齿; ♀线形。额黑红褐色, 不凸出。下唇须背面黑红褐色, 腹面污白色, ♂尖端、♀1/4伸出额外。头顶前半部浅绿色, 后半部灰绿色。胸腹部背面灰绿色, 腹部背面无立毛簇。♂后足胫节膨大, 有毛束和短端突, 2 对距。♂第 3 腹节腹板具 1 对刚毛斑。♂第 8 腹节腹板中部浅凹陷, 背板凸出。

前翅长: ♂♀15—18 mm。前翅顶角较钝, 外缘略凸出; 后翅外缘在 M_3 脉端有尾突。翅面灰绿色, 带橄榄绿色调。前翅前缘暗红褐色; 内外线白色, 极细弱, 内线外侧和外线内侧带有暗绿色; 中点暗绿色、细长; 无缘线; 缘毛灰红褐色。后翅斑纹同前翅, 外线中部凸出。翅反面浅灰绿色, 无任何斑纹。

♂外生殖器: 钩形突发达粗壮, 尖端细。背兜侧突膜质, 短于钩形突。颚形突中突尖三角形。抱器瓣端部钝圆; 抱器背前缘微弱凸出; 腹缘的耳状突中等大, 钝圆; 抱器腹与抱器相接, 端部为 1 指状端突, 末端具细刺; 抱器掌状, 端部为 1 钩状尖刺。阳端基环为 1 对小凸起。囊形突小, 半圆形。有味刷。阳茎骨化, 细长针状。

♀外生殖器: 未知。

检视标本: IZCAS: 1♂2♀♀, 云南丽江玉龙山, 1962. VII. 21—23, 宋士美采。

BMNH: 1♂, holotype, Thibet, Ta-ho, Chasseurs Indigènes, Printemps 1895, Ex. Oberthür Coll., Brit. Mus. 1927-3.

ZFMK: 10♂♂5♀♀, Li-kiang (China), Provinz Nord-Yuennan, 28. 6—13. 8. 1934, H. Höne; 5♂♂4♀♀, *ibidem*, 30. 6.—22. 8. 1935, H. Höne.

分布: 云南、西藏。