

Cherrapunji, Nov. 1893, Assam, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (other labels: *Thalassodes hypocrites* Prout ♂, Seitz. 11k; *albomaculata* Hmpon); 1 ♂, Sikkim, VIII. 1909, F. Moller, 1910-140; 1 ♀, Gopaldhara, Darjeeling, 4720 ft (H. Stevens), VIII. 1918, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1 ♂, Site 25, April, G. Api 900 m, 427550 Lower montane forest MV and Act, SARAWAK: Gunong Mulu Nat. Park, R. G. S. Exped. 1977-8, J. D. Holloway *et al.*, B. M. 1978-206 (BMNH slide NO. 16737).

AG Collection: 1 ♀, Hong Kong: Victoria Peak Hong Kong Island. 13. 6. 93.

分布: 海南、香港; 印度, 马来西亚, 新加坡, 印度尼西亚。

(312) 丽斑翠尺蛾 *Orothalassodes pervulgatus* Inoue, 2005

*Orothalassodes pervulgatus* Inoue, 2005, *Trans. lepid. Soc. Japan*, **56** (4): 284, figs. 5—6, 13, 18. Holotype ♂, Pakistan, NE India, Nepal, Thailand, Vietnam, Taiwan, Philippines.

额绿色。♂第8腹节腹板和背板均二分裂状, 腹板两突间距较宽, 骨化更强。翅亮蓝绿色, 两翅有白色条纹。后翅外缘在  $M_3$  脉端有小凸起。

♂外生殖器: 抱器背基部膨大。抱器腹边缘强骨化且具小齿。横带片边缘伸出1三角形小突。阳茎盲囊细长, 阳茎体粗壮, 膨大、褶皱的骨片上具2个杆状的骨化突。

♀外生殖器: 囊导管骨化, 圆柱形, 几乎和卵形的囊体等长。无囊片。

未见标本。以上描述根据 Inoue (2005)。

分布: 中国台湾; 印度东北部, 尼泊尔, 巴基斯坦, 越南, 泰国, 菲律宾 (吕宋岛)。

## 58. 海绿尺蛾属 *Pelagodes* Holloway, 1996

*Pelagodes* Holloway, 1996, *Malay. Nat. J.*, **49** (3—4): 261. **Type species:** *Thalassodes aucta* Prout, 1912, by original designation. N. E. Himalaya.

头胸腹部: ♂触角基半部双栉形, 栉齿出自各节末端, 紧贴触角干, 端半部线形带纤毛; ♀线形带纤毛。额略凸出, 鳞片粗糙。下唇须发达, ♀第3节略延长。胸腹部背面无立毛簇。♂后足胫节不膨大, 2对距。♂第3腹节腹板无刚毛斑。♂第8腹节腹板通常为1对大尖齿, 尖齿上通常有个数不等的小齿, 偶尔光滑; 背板凸出, 偶尔边缘凹陷。

翅: 前翅顶角较尖, 后翅顶角略凸出但圆; 前后翅外缘光滑, 后翅外缘中部折角状凸出, 外缘在中部凸出之上直或略呈浅弧形, 中部凸出至臀角直, 后缘延长。翅面蓝绿色, 半透明状, 散布白色纤细碎纹。前翅前缘黄褐色, 内线向外倾斜, 较直, 有时模糊; 外线直, 几乎与后缘垂直, 常位于翅中部。后翅外线上半段直或略波曲, 在  $CuA_1$  处内折, 下方呈波曲状。翅反面色较浅, 隐见翅正面外线。