

上半部黑色，下缘较凸出。下唇须白色，第1、第2节鳞片粗糙，第3节较光滑，较长，♂约1/4伸出额外。头顶黄白色。♂后足胫节膨大，有毛束，2对距，具短端突。♂第3腹节腹板有两丛刚毛。♂第8腹节腹板、背板无特化。

前翅长：♂20 mm。翅面白色，杂黄褐色。前翅外缘细圆锯齿形；前缘多黄褐色；内线黄褐色，在中室下缘上方波状，在前缘处为深褐色斑，在臀褶上方形成1个大折角；中点黄褐色，细长条状；外线黄褐色锯齿形，齿在翅脉上色深；外线外侧至亚缘线间黄褐色较多，色略深；亚缘线白色锯齿形；缘线黄褐色，在翅脉端间断，在脉间扩展成小褐斑；缘毛白色，杂少量黄褐色。后翅后缘延长；外缘圆锯齿形；中点淡褐色细弱，上面有白色长鳞片覆盖；外线、亚缘线、缘线、缘毛同前翅。翅反面：两翅基部白色，前翅有黑色短条状中点，后翅中点为小点或无；前后翅均有黑色端带，前翅端带在M脉间达外缘，后翅端带在M₂附近扩展至外缘。

♂外生殖器：背兜侧突细长、尖。颚形突中突短二分叉，具微齿。抱器瓣基宽端窄，尖端有微齿；抱器背基突为细长强骨化大齿，密布微刺，抱器背近端部处有2齿，内侧的齿骨化极弱，外侧的齿骨化强，尖端圆；抱器腹缘向内折叠，有2突，近基部处呈指状，近端部处呈小丘状。横带片微骨化。阳端基环为细长骨化突。囊形突近半圆形凸出。味刷发达。阳茎短粗，无角状器，端部阳茎端膜弱骨化。

♀外生殖器：未知。

寄主：漆树科 Anacardiaceae: *Euroschinus*; 豆科 Leguminosae (Fabaceae): 木荚豆 *Xylia xylocarpa*; 芸香科 Rutaceae: 巨盘木属 *Flindersia*; 无患子科 Sapindaceae: 荔枝 *Litchi chinensis*、红毛丹 *Nephelium lappaceum*。

检视标本：IZCAS: 1♂，广东海南通什，340 m，1973. VI. 2，陈一心采；1♂，广东海南保亭，80 m，1973. V. 23，陈一心采。

分布：海南；印度尼西亚。

备考：在英国自然历史博物馆检视到澳大利亚亚种 *subsp. candidaria* Warren, 1894 的模式标本：1♂，type, Australia specimen photog for Checklist Aust Lep, Film 78129, BMNH slide NO. 11056。

(76) 浅粉尺蛾 *Pingasa chloroides* Galsworthy, 1998 (图 136, 图 460, 图 751, 图版 X: 10, 11)

Pingasa chloroides Galsworthy, 1998, *Trans. lepid. Soc. Japan*, **49** (2): 104, figs. 1—2. Holotype ♂, China: Hong Kong. (BMNH)

Pingasa chlora crenaria Chu, 1981, in Zhu et al., *Iconographia heterocerorum Sinicorum*, **1**: 114, pl. 30: 766. (nec Guenée, 1858)

♂触角双栉形。额下缘及基部白色，中部为黑色带。下唇须白色，第1、第2节鳞

片粗糙，第3节较光滑，约1/4伸出额外。头顶白色，散布褐色鳞片。胸部背面灰白色，头顶后部至前胸灰色较多。♂第3腹节腹板中部具1对刚毛斑，中间有稀疏刚毛相连。

前翅长：♂17—18 mm。前翅外缘圆锯齿形，前缘散布黑色鳞片；内线黑褐色波状，在中室下缘至A脉间较凸出；中点为中室端脉上的细长条，上部内弯；外线黑褐色锯齿形，齿尖在翅脉上呈黑点状；内线和外线之间色浅，白色散布黄褐色；外线外侧多灰褐色鳞片；亚缘线白色，略波曲；缘线褐色，在脉间为小点；缘毛白色杂少量褐色。后翅外缘圆齿较前翅大；顶角圆，后缘延长；中点弱小；外线、亚缘线、缘线、缘毛同前翅。翅反面：前翅基部白色，中点同正面；后翅无中点；前后翅均有宽阔黑色端带，前翅端带上宽下窄，仅在M₁—M₃间达外缘，后翅端带仅在M₂附近向外缘扩展。

♂外生殖器：背兜侧突强骨化，基粗端细，端部1/2二分叉。颞形突侧臂及中突强骨化，中突二分叉，具密刺。抱器瓣强骨化；抱器背端突为1大三角形尖齿；抱器腹端部亦有1大尖齿，但较抱器背端突细。阳端基环下半部较窄，弱骨化，上半部宽阔，强骨化，钝圆形。囊形突较短，半圆形。味刷发达。阳茎短粗，端部骨化，有1小刺状角状器。

♀外生殖器：交配孔周围强骨化，前后阴片不清晰。囊导管细长，约为囊体长度的2倍，膜质、褶皱；囊体小，无囊片。

检视标本：IZCAS：1♀，福建林下，1981. VIII. 4，黄水势采；1♂，广州植物园，1978. VI. 2；1♂，广东植物园，1978. VI. 13；2♂♂，广州石牌，1958. VIII. 26—27，王林瑶采；1♀，同前，1958. IX. 10；1♂，广州，1958. X. 3，张宝林采。

BMNH：1♂，holotype，Kadoorie Agric Research Centre Shek Kong，N. T.，Hong Kong，UTM，50Q KV 020 833，8 Mar. 1997，125W MBF，coll. R. C. Kendrick (BMNH slide NO. 19189)；1♂，paratype，Hungshuikiu，J. Y. Z. Hongkong，Coll. By H. K. G.，BMNH (E) 1998-126；1♂，paratype，Lai Chi Chong，Hong Kong，12. 6. 1997，Leg G Reels；1♂，paratype，Cochin China：Nacham. VII. 1936，S. Masseyeff，B. M. 1937-658；1♀，paratype，Fauling，S. E. China. Sept. 1911. (E. Wahr)，Rothschild Bequest，B. M. 1939-1；1♂，paratype，Hong Kong，2/92，JJW，Hong Kong 92-114 (BMNH slide NO. 11061)。

分布：福建、广东、香港；越南。

(77) 直粉尺蛾 *Pingasa lariaria* (Walker, 1860) 中国新记录 (图 137, 图 461, 图版 X: 12, 13)

Hypochroma lariaria Walker, 1860, *List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus.*, 21: 433. Syntype(s) ♀, [Borneo]: Sarawak. (OUM)