

齿；抱器瓣近中部具1刚毛脊，中部凸出呈片状。阳茎体短粗，杯状，阳茎盲囊细长，均骨化；角状器为浓密发达骨化刺。

♀外生殖器：未知。

检视标本：BMNH: 1♂, holotype, Wa-Shan, 6000 ft, A. E. Pratt coll. July 1889, Leech Coll. 1900-64; 1♂, Tay-Tou-Ho, Chasseurs Thibetains, 1896, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; 1♂ 1♀, Tay-Tou-Ho, 1897, Ex RP. Déjean, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; 1♂, Siao-lou, Chasseurs Indigènes, du P. Déjean, 1902, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3; 1♀, Vallee du Tong-Ho, Chasseurs Indigènes, 15 April-15 Mai, 1893, Ex. Oberthür Coll. Brit. Mus. 1927-3.

ZFMK: 1♀, Tay-Tou-Ho, Chasseurs Thibétains, 1896, (other labels: *incomptaria* Leech, abgebildet Seitz IV. Suppl. fig.; *Euchloris incomptaria* Leech. *Ann. Mag. nat. Hist.* XX, p. 239); 1♀, Tay-Tou-Ho, Chasseurs Thibétains, 1896 (other label: *Spaniocentra incomptaria* Leech, *Ann. Mag. nat. Hist.* XX. p. 239.); 2♂♂, Siao-Loû, Chasseurs Indigènes du P. Déjean, 1903.

分布：四川。

(170) 琨环斑绿尺蛾 *Spaniocentra kuniyukii* Yazaki, 1994 中国新记录 (图 223, 图 547, 图版 XV: 15)

Spaniocentra kuniyukii Yazaki, 1994, in Haruta, *Tinea*, **14** (Suppl. 1): 7, pl. 67, fig. 5; text-fig. 334. Holotype♂, [Nepal]: Sagarmatha, Okhaldhunga. (NSMT)

触角、下唇须、额、头顶、胸部、腹部基本同荷氏环斑绿尺蛾 *S. hollowayi*。

前翅长：♂12 mm; ♀14 mm。翅面颜色斑纹大部分同荷氏环斑绿尺蛾，有以下不同：前翅臀角的褐斑更大，杂有很多银色鳞片，中央白色，此斑上缘可达 M_3 ；后翅顶角斑略大于荷氏环斑绿尺蛾。

♂外生殖器：钩形突短小，端部尖。背兜侧突特别弱小，膜质。颚形突中突骨化，弯曲。抱器瓣端部略尖；抱器背基半部骨化，端半部膜质，其骨化与膜质分隔的部位具1骨化小突，沿此小突至抱器瓣端部为1具刺的脊；抱器强骨化，端部圆，具大小不等的刺。横带片宽阔，上缘弧形。阳端基环下半部近三角形，上半部为钝形突。囊形突凸出。阳茎骨化，阳茎鞘上具1大骨化刺，端部尖，无角状器。

♀外生殖器：未知。

检视标本：IZCAS: 1♂ 1♀, 海南尖峰岭, 1980. III. 20、IV. 20, 张宝林采; 1♀, 同前, 1982. X. 15, 陈佩珍采。

BMNH: 1♂, S. India, T. R. Bell, B, M. 1934-394 (BMNH slide NO. 14186).

分布：海南；印度，尼泊尔。