

red type label); 2♂♂, Khasis, Nat. Coll.; 2♂♂1♀, Khasia Hills, Assam, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 1♂, Khasis, Nat. Coll., Collectio H. J. Elwes, Rothschild Bequest, B. M. 1939-1; 2♂♂, Khasis, Nat. Coll., Adams Bequest, B. M. 1912-399; 1♂, Cherrapunji, Ex. Oberthür Coll., Brit. Mus. 1927-3.

**分布:** 湖北、广西、云南、西藏；印度，尼泊尔，缅甸。

**备考:** 原始描述中翅展有范围，因此模式标本不仅1头，但其他模式标本很难判断，只能确定1头模式标本。

### 斑镰翅绿尺蛾锡金亚种 *Tanaorhinus kina embrithes* Prout, 1934 (图版Ⅹ: 9, 10)

*Tanaorhinus kina embrithes* Prout, 1934, *Novit. zool.*, **39**: 102. Syntypes 10♂♂, 1♀, [India]: Sikkim, Gopaldhara. (BMNH)

翅反面斑纹较指名亚种有些不同：前翅端部为清晰的两列点；后翅端带较宽。

**检视标本:** BMNH: 1♂, syntype, Gopaldhara, Darjeeling, 3440—5800 ft, (H. Stevens), Rothschild Bequest, B. M. 1939-1 (with red type label).

ZFMK: 1♂, syntype, Gopaldhara, Darjeeling, 3440—5800 ft, (H. Stevens) (length of forewing 24 mm); 1♂, Siao-Lou, Chasseurs Indigènes, du P. Déjean, 1903 (length of forewing 27.5 mm).

**分布:** 四川；印度。

### 斑镰翅绿尺蛾台湾亚种 *Tanaorhinus kina flavinfra* Inoue, 1978 (图版Ⅹ: 11, 12)

*Tanaorhinus flavinfra* Inoue, 1978, *Bull. Fac. domest. Sci.*, *Otsuma Wom. Univ.*, **14**: 207, figs 7, 9, 10. Holotype♂, Taiwan: Chiai, Alishan. (BMNH)

*Tanaorhinus kina flavinfra*: Inoue, 1992a, in Heppner & Inoue (ed.), *Lepid. Taiwan*, **1**: 120.

翅色较暗；前翅顶角镰状凸出比指名亚种弱，后翅臀角较圆；正面斑纹比指名亚种弱，翅反面黑色中点更退化；后翅反面端带大部消失。

**检视标本:** BMNH: 1♂, holotype, Taiwan: Chiai, Alishan, 2200 m, 9—11.VII.1964, H. Inoue, Inoue Coll. B. M. 1992-71 (Type status verified K. Buckmaster 1992).

**分布:** 中国台湾。

### (103) 纹镰翅绿尺蛾 *Tanaorhinus luteivirgatus* Yazaki et Wang, 2004 (图 162, 图 486, 图 773, 图版Ⅹ: 13, 14)

*Tanaorhinus luteivirgatus* Yazaki et Wang, 2004, *Tinea*, **18** (1): 58, figs. 3, 4, 11,