

徽、浙江、湖北、湖南；俄罗斯，日本，朝鲜半岛。

(160) 清二线绿尺蛾 *Thetidia atyche* (Prout, 1935) (图 214, 图 538, 图版 XV: 5)

Euchloris atyche Prout, 1935, in Seitz, *Macrolepid. World*, **4** (Suppl.): 18, pl. 3c.

Holotype♂, China (west): Siao-lou. (BMNH)

Thetidia atyche: Fletcher, 1979, in Nye, *Generic Names of Moths of the World*, **3**: 204.

♂触角双栉形，外侧栉齿长于内侧，最长栉齿约为触角干直径的6倍，尖端栉齿渐短。额不凸出，淡绿色，鳞片粗糙。下唇须淡绿色，略短于1/2伸出额外。头顶绿色。胸腹部背面淡绿色，无立毛簇。后足胫节未见毛束，2对距。♂第3腹节腹板有1对微弱刚毛斑。♂第8腹节腹板略骨化。

前翅长：♂12—14 mm。翅面淡绿色带黄绿色调，后翅颜色较前翅浅。前翅顶角钝，后翅顶角圆且略凸出；两翅外缘光滑。前翅前缘白色；无内线；外线细弱白色；无中点；无缘线；缘毛基半部绿色，端半部白色。模式标本后翅无斑纹，另1标本有白色细弱的亚缘线。翅反面模式标本无斑纹；另1标本斑纹和正面相似，但前翅无内线，后翅有外线。

♂外生殖器：钩形突二分叉状，向尖端渐细。背兜侧突向尖端渐细，长于钩形突，端部外弯。颚形突侧臂弱骨化，在中部不相接。背兜短宽。抱器瓣狭长简单，膜质，端部钝圆。囊形突极凸出，宽大于长，端部二分裂状，呈半圆形凹陷，两分叉端部略细，但钝。阳茎略粗；阳茎盲囊较阳茎体粗。

♀外生殖器：未知。

检视标本：BMNH: 1♂, holotype, Siao-Lou, Chasseurs, Indigenes du P. Déjean, 1901 (BMNH slide NO. 21777); 1♂, Frontiere orientale du Thibet, Chasseurs, Indigenes du P. Déjean, 1905.

分布：四川。

(161) 肖二线绿尺蛾 *Thetidia chlorophyllaria* (Hedemann, 1879) (图 215, 图 539, 图版 XV: 6)

Phorodesma chlorophyllaria Hedemann, 1879, *Horae Soc. ent. Ross.*, **14**: 510, pl. 3, fig. 7.

Syntype(s), [Russia]: Amur, Askold Island.

Phorodesma jankowskiaria Oberthür, 1879, *Diagnoses Espèces nouv. Lépid. l' Ile Askold*:

8. Syntype(s), [Russia]: Askold.

Nemoria chlorophyllaria: Gumpfenberg, 1895, *Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.*, **64**: 490.

Euchloris chlorophyllaria: Staudinger, 1901, in Staudinger & Rebel, *Cat. Lepid. palaeart.*