

分布 浙江 (龙泉)、湖南 (衡山)、福建 (龙栖山)。

(216) 大掩耳螽 *Elimaea (Rhaebelimaesa) maja* Gorochoy, 2009

Elimaea (Rhaebelimaesa) maja Gorochoy, 2009. Proc. Rus. Ent. Soc., 80(1): 98 (Holotype, M, origi. descrip.; type locality: Yunnan; type depository: ZIS, S. Petersburg).

特征记述 雄性 肛上板适度纵长, 端部狭圆。尾须狭长, 基部和中部微内弯, 端部明显内弯, 具小端勾。下生殖板侧面观明显上弯, 狭的端半部具狭的中凹, 近端部侧面观微加宽。外生殖器在膜状侧叶的端部具 1 对内弯的细圆齿状骨片。

雌性未知。

体色 黄色。前胸背板中线、腹部背面、肛上板背面玫红色; 触角鞭节的背侧面和前胸背板的背面及前复翅径中脉域具棕色点; 前复翅侧域沿背域的边缘具无数的小暗色点; 前复翅中部和端部暗色; 尾须端部暗色。

雄性量度 (mm) 体长: 25.0-26.0; 带后翅长的体长: 49.0-51.0; 前胸背板长: 5.5-5.6; 前复翅长: 38.0-39.0; 后足腿节长: 26.5。

观察标本 未见。

分布 云南。

(217) 秀掩耳螽 *Elimaea (Rhaebelimaesa) alia* Gorochoy, 2009

Elimaea (Rhaebelimaesa) alia Gorochoy, 2009. Proc. Rus. Ent. Soc., 80(1): 100 (Holotype, F, origi. descrip.; type locality: Yunnan; type depository: ZIS, S. Petersburg); Liu *et* Liu, 2011. Zootaxa: 5.

特征记述 雌性 下生殖板横宽, 后侧叶分成 2 部分, 即 1 短的三角形后侧突和 1 尖长的中突。生殖突基片腹端具明显的指状突起。

雄性未知。

体色 绿色。复眼、前胸背板背面无数的小点棕色; 触角鞭节的基部较浅棕色; 前复翅前缘域具大的玫红色点。

雌性量度 (mm) 体长: 21.0; 带后翅长的体长: 48.0; 前胸背板长: 4.9; 前复翅长: 37.0; 产卵器长: 6.8。

观察标本 1♀, 云南西双版纳勐仑, 580 m, 1993. IX. 8, 徐环李采。

分布 云南。

(218) 细沟掩耳螽 *Elimaea (Rhaebelimaesa) tenuiuscula* Gorochoy, 2009

Elimaea (Rhaebelimaesa) tenuiuscula Gorochoy, 2009. Proc. Rus. Ent. Soc., 80(1): 99 (Holotype, F, origi.