

分布 浙江 (龙泉)、湖南 (衡山)、福建 (龙栖山)。

**(216) 大掩耳螽 *Elimaea (Rhaebelimaesa) maja* Gorochov, 2009**

*Elimaea (Rhaebelimaesa) maja* Gorochov, 2009. Proc. Rus. Ent. Soc., 80(1): 98 (Holotype, M, origi. descrip.; type locality: Yunnan; type depository: ZIS, S. Petersburg).

**特征记述** 雄性 肛上板适度纵长, 端部狭圆。尾须狭长, 基部和中部微内弯, 端部明显内弯, 具小端勾。下生殖板侧面观明显上弯, 狭的端半部具狭的中凹, 近端部侧面观微加宽。外生殖器在膜状侧叶的端部具 1 对内弯的细圆齿状骨片。

雌性未知。

体色 黄色。前胸背板中线、腹部背面、肛上板背面玫红色; 触角鞭节的背侧面和前胸背板的背面及前复翅径中脉域具棕色点; 前复翅侧域沿背域的边缘具无数的小暗色点; 前复翅中部和端部暗色; 尾须端部暗色。

雄性量度 (mm) 体长: 25.0-26.0; 带后翅长的体长: 49.0-51.0; 前胸背板长: 5.5-5.6; 前复翅长: 38.0-39.0; 后足腿节长: 26.5。

观察标本 未见。

分布 云南。

**(217) 秀掩耳螽 *Elimaea (Rhaebelimaesa) alia* Gorochov, 2009**

*Elimaea (Rhaebelimaesa) alia* Gorochov, 2009. Proc. Rus. Ent. Soc., 80(1): 100 (Holotype, F, origi. descrip.; type locality: Yunnan; type depository: ZIS, S. Petersburg); Liu *et* Liu, 2011. Zootaxa: 5.

**特征记述** 雌性 下生殖板横宽, 后侧叶分成 2 部分, 即 1 短的三角形后侧突和 1 尖长的中突。生殖突基片腹端具明显的指状突起。

雄性未知。

体色 绿色。复眼、前胸背板背面无数的小点棕色; 触角鞭节的基部较浅棕色; 前复翅前缘域具大的玫红色点。

雌性量度 (mm) 体长: 21.0; 带后翅长的体长: 48.0; 前胸背板长: 4.9; 前复翅长: 37.0; 产卵器长: 6.8。

观察标本 1♀, 云南西双版纳勐仑, 580 m, 1993. IX. 8, 徐环李采。

分布 云南。

**(218) 细沟掩耳螽 *Elimaea (Rhaebelimaesa) tenuiuscula* Gorochov, 2009**

*Elimaea (Rhaebelimaesa) tenuiuscula* Gorochov, 2009. Proc. Rus. Ent. Soc., 80(1): 99 (Holotype, F, origi.

descrip.; type locality: Yunnan; type depository: ZIS, S. Petersburg); Liu *et* Liu, 2011. Zootaxa: 5.

**特征记述** 雌性 前复翅狭，下生殖板横宽，三角形后侧突刺状，狭长，侧突间具明显中突。产卵器微上弯，生殖突基片腹端无角形突起。

雄性未知。

**体色** 绿色。复眼、前胸背板背面无数的小点棕色；触角鞭节的基部黄色，其余部分棕色；前复翅背域的小脉之间的区域稍浅棕色；触角鞭节的中部暗色，具稀疏的浅棕点；前复翅侧域具 1 排短的纵带，此纵带由许多色点组成。

**雌性量度 (mm)** 体长：24.0；带后翅长的体长：47.0；前胸背板长：4.5；前复翅长：36.0；后足腿节长：27.0；产卵器长：8.0。

**观察标本** 未见。

**分布** 云南。

### (219) 少掩耳蠹 *Elimaea (Rhaebelimaea) junia* Gorochov, 2009

*Elimaea (Rhaebelimaea) junia* Gorochov, 2009. Proc. Rus. Ent. Soc., 80(1): 99 (Holotype, F, origi. descrip.; type locality: Yunnan; type depository: ZIS, S. Petersburg); Liu *et* Liu, 2011. Zootaxa: 4.

**特征记述** 雌性 下生殖板横宽，三角形后侧突短尖，侧突间距离宽，近无中突。产卵器生殖突基片腹端具小角形突起。

雄性未知。

**体色** 绿色。复眼、触角鞭节的基部侧面、前胸背板背面无数的小点及前复翅背域的小脉之间的区域棕色；触角鞭节的中部暗色，具稀疏的浅棕色点；前复翅侧域沿背域的地方的无数的小点及 Sc 脉和 M 脉之间的散点略为棕色；前复翅的前缘域具微玫红色的小点；前胸背板侧叶、前足和中足腿节具无数的红棕色的点。

**雌性量度 (mm)** 体长：25.0；带后翅长的体长：48.0；前胸背板长：4.5；前复翅长：36.0；产卵器长：7.0。

**观察标本** 未见。

**分布** 云南。

## 6) 直缘掩耳蠹亚属 *Rectielimaea* Liu, 2011

*Elimaea (Rectielimaea)* Liu, 2011. In: Liu *et* Liu, 2011, Zootaxa, 2935: 15.

**Type species:** *Elimaea (Rectielimaea) percauda* Liu *et* Liu, 2011; original designation.