

眉山、青城山、蒙顶山、周公山)、云南 (腾冲、维西、富宁)、西藏 (通麦、墨脱); 印度, 尼泊尔。

讨论 该种被 Uvarov (1924) 首次记录中国云南有分布, 使用的名称是 *Isopsera stylata* 并在以后的名录中多次被引用。*I. spinosa* Ingrisch, 1990 采自印度 (大吉岭), 外部形态与芒平背螽 *I. stylata* Brunner, 1878 非常相似, 但不同的是该种前足和中足腿节腹面具刺, 雄性下生殖板具 3 条隆线。在中国所采的这些标本, 基本上各足腿节腹面均具刺, 雄性下生殖板具 3 条隆线, 可以断定为刺平背螽 *I. spinosa*, 并非芒平背螽 *I. stylata*。

(20) 缺刻平背螽 *Isopsera brevissima* Shiraki, 1930

Isopsera brevissima Shiraki, 1930. Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 20(111): 342-344 (Syntype, M, origi. descrip.; type locality: Eastern Asia, China, Taiwan, Urai, Arisan, Karenko; type depository: NTUC Taipei Univ.); Liu et Jin, 1994. Contr. Shanghai Inst. Entomol., 11: 105; Jin et Xia, 1994. J. Orth. Res., 3: 22.

鉴别特征 体型略大 (前复翅长 39.0-42.0 mm); 雄性尾须端部突然削尖, 雌性下生殖板端部具极短的缺刻。

特征记述 雄性 头顶端部稍侧扁, 狭于触角基节, 与额顶角相接触, 背面具沟。复眼卵形, 突出。前胸背板较短, 背面平坦; 侧叶稍微高大于长, 后缘肩凹较明显。前后翅均发达, 发育完全。前复翅端部圆形, 具光泽, 半透明; Sc 脉和 R 脉从基部分开, Rs 脉从 R 脉中部前分出, 分叉。后翅长于前复翅, 端部较尖。前足基节具刺; 前足和中足腿节腹面缺刺; 后足腿节腹面具刺, 膝叶具 2 刺; 前足胫节背面具沟和 1 外端距, 内外两侧听器均为开放型。第 10 腹节背板后缘直, 肛上板较小, 三角形; 尾须内弯, 端部突然削尖; 下生殖板向端部趋狭, 端缘具三角形凹口, 端管细长, 约为纵中隆线的 2/3 长。

雌性 尾须较短, 圆锥形。下生殖板端部具极短的缺刻。产卵器较短, 背缘较直, 腹缘强弯曲, 端部 1/4 具钝的细齿。

体色 绿色。触角赤褐色。

量度 (mm) 体长: ♂ 23.0-25.0, ♀ 25.0; 前胸背板长: ♂ 5.5-6.0, ♀ 6.2; 前复翅长: ♂ 39.0-42.0, ♀ 40.0; 后足腿节长: ♂ 25.0-26.0, ♀ 27.0; 产卵器长: 6.2。

观察标本 1♂, 台湾台北, 坪林乡石槽村, 2008.VII.2, 黄世富采 (IZCAS)。

分布 中国台湾 (台北)。