

黑色。

雄性量度 (mm) 体长: 26.0-28.0; 前胸背板长: 5.5-6.0; 前复翅长: 35.0-36.0; 前复翅最宽: 10.0; 后翅长: 38.5-40.0; 后足腿节长: 17.0。

观察标本 1♂ (正模), 海南, 乐东, 尖峰岭, 1982.VII.6, 刘元福采 (MSIE); 1♂, 1♀, 海南尖峰岭, 340 m, 1981.VII.23, 顾茂斌、林又东采 (IZCAS)。

分布 海南 (乐东)。

(114) 双叶麻螽 *Tapiena bilobata* Liu et Kang, 2010 (图 159 c, n-q)

Tapiena bilobata Liu et Kang. 2010. Zootaxa, 2328: 62 (Holotype, M, origi. descrip.; type locality: China, Yunnan, Ruili; type depository: IZCAS, Beijing).

特征记述 雄性 大小、颜色、后头、前胸背板、前复翅和腿刺均非常类似于 *T. spinicaudata*、*T. stridulous* 和 *T. quadridens*。该种与这些种的区别如下: 雄性前复翅 Rs 脉在前复翅中部稍前分出, R 脉主干另具 2 侧支。雄性第 10 腹节背板在基部 1/8 处具 1 半圆形的中凹, 1 较深的较宽的中纵沟将雄性第 10 腹节背板分成 2 对称的侧叶, 在该沟的两侧同样具微凹的区域, 端部背面多刺; 侧面观端半部背腹向扩大成 1 指向腹面的较大的刺状突, 端缘近平截。尾须粗短, 端部内弯成 1 三角形的刺。下生殖板狭长, 端缘在 2 侧叶间具 1 三角形的深凹, 侧叶渐变狭, 端管长圆柱形。

雌性未知。

体色 绿色。复眼深棕色。前足腿节侧面具几排小的黑色的侧条纹。尾须端部棕色。

雄性量度 (mm) 体长: 23.5; 前胸背板长: 4.5; 前复翅长: 32.0; 前复翅最宽: 6.8; 后翅长: 36.0; 后足腿节长: 15.0。

观察标本 1♂ (正模), 云南瑞丽, 1981.X.17, 熊江采 (IKCAS)。

分布 云南 (瑞丽)。

(115) 双带麻螽 *Tapiena bivittata* Liu et Xia, 1992 (图 160 a-f)

Tapiena bivittata Liu et Xia, 1992. In: Huang, Insects of Wuling Mountains Area, Southwestern China: (Holotype, F, origi. descrip.; type locality: China, Guizhou, Mt. Fanjing; type depository: MSIE, Shanghai); Liu et Kang, 2010. Zootaxa, 2328: 52.

特征记述 体型中等, 头部背面和前胸背板密被刻点。头部背面稍平坦, 颜面侧观近乎垂直。头顶角锥形, 基部近与触角基节等宽, 背面具 1 较狭的沟, 端部明显变狭, 端尖圆, 与额顶角通过 1 条横沟分开。额顶角端部平截。后头微凸, 背缘近平。前胸背板背面近平, 后侧角圆形, 前缘中间微凹, 后缘圆; 中横沟大约在中间穿过纵中线; 前