

非洲沙粒魮 *Urogymnus africana* (Bloch et Schneider, 1801) (图 229)

Raja africana Bloch et Schneider, 1801, *Ichth. Bloch.* : 367 (几内亚).

非洲沙粒魮 *Urogymnus africana*: 朱元鼎, 1960, 中国软骨鱼类志 : 156, 图 145 (海南莺歌海); 朱元鼎, 1962, 南海鱼类志 : 61, 图 48 (莺歌海).

测量标本 1 尾; 全长 964 mm; 采自海南省莺歌海。

体盘卵圆形, 前缘平圆, 前端微尖凸, 宽比长为小; 尾细而较短, 无尾刺, 无皮褶。眼小而高突, 位于喷水孔上缘之中部, 上缘具一圆形角状突起, 眼径等于喷水孔直径的 $1/2$, 眼间隔凹入, 约与吻长相等。喷水孔很大, 椭圆形, 上缘前部伸达眼前。鼻孔宽大, 前鼻瓣宽大, 连合成一长方形口盖, 伸达口前, 后缘平直细裂; 后鼻瓣前部具一扁环形突出, 为入水孔边缘, 后部转入于鼻腔内。口小, 横列, 口缘波曲, 口宽约为口前吻长的 $1/2$, 上下唇很发达, 具许多圆形乳头状突起; 腭膜波曲, 后缘细裂; 口底具乳突 7 个, 中间 3 个很大, 内侧 2 个中大, 外侧 2 个低小(1, I, I, I, I, I, 1)。齿细小平扁, 椭圆形, 铺石状排列, 多行在使用, 上颌 17 纵行, 下颌 21 纵行。鳃孔 5 个, 距离约相等, 最后一个最小, 第三鳃孔宽约等于第五鳃孔间距离的 $1/9$ 。背面自头前至尾前部密具平扁和尖锐结刺, 胸鳍上具尖锐结刺粒, 尾的后部具平扁结刺。暖水性底栖中型鱼类, 体长达 1 m 余。




图 229 非洲沙粒魮 *Urogymnus africana* (Bloch et Schneider)
(全长 964 mm)

体暗褐色, 结刺黄色, 腹面白色。

分布于中国南海; 红海, 印度洋, 印度尼西亚和澳大利亚的昆士兰。