

别名：墨氏短额鲆(成庆泰, 1963)。

依沈世傑(1966), 标本 3 尾; 体长 56—74 毫米; 采自九龙半岛。

背鳍 87—88; 臀鳍 60—67; 胸鳍 11; 腹鳍 5 (Weber & Beaufort, 1929 及 Norman, 1934, 为 6); 尾鳍 17。侧线鳞 49—53; 鳃耙 6—7。椎骨 10+24—25 个。

体长为头长 4—4.4 倍, 为体高 1.8—2 倍。头长为吻长 4.6—4.8 倍, 为眼径 3.7—4.1 倍, 为眼间隔 6.8—7.7 倍, 为上颌长 3.1—3.3 倍, 为最长背鳍条 3.4—3.5 倍, 为最长胸鳍条 1.4—1.8 (左) 或 2—2.5 (右) 倍, 为尾柄高 1.8—2 倍。

体卵形, 稍厚。头背缘轮廓凸形, 无凹刻。两眼之间凹形, 宽为眼纵径 1/2, 下眼 1/2 位上眼前方。无吻棘和眼棘。上颌略伸过眼前缘。鳃耙扁尖。

鳞长方形, 很大, 体长为鳞长 18.78—23.05 倍, 鳞长为鳞宽 1.3—1.6 倍。有眼侧鳞栉刺很弱, 短毛刺状, 鳞长为刺长 15.5—18.8 倍, 鳞后端一行刺为 41—55 个; 无眼侧被圆鳞。鳞外露部分有辐状纹 30—65 条, 两侧辐状纹 10—50 条。侧线在有眼侧很发达。鳞易脱落。

背鳍始于无眼侧前鼻孔之后。尾鳍钝尖。

颅骨中等大而较高, 标准体长为其长 4.5 倍; 颅骨长为骨高 2.8 倍。第一髓棘很短, 第 2—3 较其后的髓棘稍宽。第一脉弓(肾脉弓)属第 6 椎骨。第一脉棘属第 11 椎骨, 较其后的脉棘宽。第一间脉棘较宽, 末端弱, 突出于臀鳍前方; 横突及侧突(parapophysis)(即肾脉突)发达。后匙骨一个。腰带骨位匙骨前方。颅骨背侧担鳍骨(ptyergophore epicraniens) 15 个, 第一个未延长。

有眼侧为淡暗褐色, 体上有许多小黑斑, 背、臀鳍边缘淡黑色。

为热带小型底层海鱼。在印度南侧可达水深 191.9 米海区, 大鱼体长达 110 毫米(依 Norman, 1934)。

在我国曾见于广东九龙半岛; 分布西达印度南侧, 南达印度尼西亚, 东北达菲律宾。

宽额短额鲆 *Engyprosopon latifrons* (Regan) (图 II-48)

Scaops latifrons Regan, 1908, *Trans. Linn. Soc.* 12: 233, Pl. 25, fig. 3 (Saya de Malha Bank).

Engyprosopon latifrons Norman, 1934, *Syst. Monogr. Flatfish.* I: 213, fig. 160 (塞舌尔群岛, 马尔代夫群岛及 Cargados Carajos); Shen (沈世傑), 1966, *Q. Jl. Taiwan Mus.* 20(1—2): 182, fig. 47—50 (中沙群岛: 北纬 160°04', 东经 114°39' 及北纬 15°35.5', 东经 113°54.5'; 水深 80.5—87.8 米)。

依沈世傑(1966), “标本 12 尾; 体全长 50—74 毫米, 标准体长 41—61 毫米; 采自广东中沙群岛。

背鳍 83—88; 臀鳍 63—69; 胸鳍 11—12; 腹鳍 6; 尾鳍 17。侧线鳞 41—44; 鳃耙 9; 椎




图 II-48 宽额短额鲆 *Engyprosopon latifrons* (Regan) (依 Norman, 1934)

骨 9—10+25—26个。

标准体长为体高 1.6—1.9 倍，为头长 3.3—3.6 倍。头长为吻长 4.3—5 倍，为眼径 3.1—4 倍，为眼间隔宽 2.8—3.2 倍，为上颌长 2.7—2.8 倍，为有眼侧最长胸鳍条 1.7—2 倍，为最长腹鳍条 1.7—1.8 倍，为尾柄高 2.4—2.7 倍。

体卵形，侧扁。吻短于眼径，有吻棘。下眼位较前，上眼前缘位下眼中央或后 1/3 的上方。两眼之间凹形，其宽大于眼径，无眼棘。上颌伸过下眼前缘。鳃耙细尖。

鳞卵形，很大，标准体长为鳞长 16.6—18.7 倍，鳞长为鳞宽 0.9—1.1 倍；有眼侧鳞栉刺很弱，鳞长为毛状刺长 31.5—35 倍，鳞外露部分后缘一行刺 36—39 个。无眼侧被圆鳞；鳞前部辐状纹 50—70 条，侧纹 40—65 条。

颅骨较短，三角形，标准体长为其长 5.9—6.1 倍；颅骨长为其颅骨高 2 倍，为眼窝直径 1.9 倍；前额骨较脑匣高。第一脉弓(肾脉弓)出现于第 5 或 6 椎骨；第 1 脉棘出现于第 11 椎骨，较其后的脉棘宽。横突及其侧突(肾脉突)发达。第一间脉棘较其后间脉棘宽大，下端弱且突出于臀鳍前方。腰带骨位匙骨前方。后匙骨每侧一个。颅骨背侧有担鳍骨 12 个。

有眼侧体淡褐色或暗褐色，同背、臀鳍均有淡黑斑。尾鳍中部有白色横带状斑。有眼侧胸鳍末端淡黑色。

为热带浅海小型底层鱼。大鱼体长可达 93 毫米，可达水深 36.6—91 米海区 (依 Norman, 1934)。

分布于海南中沙群岛；西达印度洋塞舌尔群岛及马尔代夫群岛。