

普来隆瓦鲽 *Poecilopsetta praelonga* Alcock (图 II-72)

Poecilopsetta praelonga Alcock, 1894, *J. Asiatic Soc. Beng.* 63(2):139, pl. vii,




图 II-72 普来隆瓦鲽 *Poecilopsetta praelonga* Alcock

体长 139 毫米, 采自台湾东港(依陈兼善、翁廷辰, 1965; 王惠民将鳍条加了节)

fig.2 (孟加拉湾); Norman, 1927, *Rec. Indian Mus.* 29:40, fig. 11 (孟加拉湾, 斯里兰卡, 安达曼海); Norman, 1934, *Syst. Monogr. Flatfish.* I:391, fig. 28 (同上; 帝汶海); Chen (陈兼善) & Weng (翁廷辰), 1965, *Biol. Bull. Dep. Biol. Tunghai Univ.* 25: 13, fig. 6 (东港); Shen (沈世傑), 1982, *Q. Jl. Taiwan Mus.* 35(3—4): 201, fig. 4 (东港); 沈世傑, 1984(2), 台湾鱼类检索: 452, 图(台湾西南)。

Poecilopsetta maculosa, Weber et Beaufort, 1929, *Fish. Indo-Austr. Archip.* 5:37 (苏门答腊, 巴里岛北, 帝汶海, 基 "Kei" 群岛)。

别名: 普来隆花鱗鲽(陈兼善, 1969); 长体瓦鲽(李思忠等, 1987)。

依陈兼善、翁廷辰 (1965): 标本 7 尾; 体长 72—139 毫米; 采自台湾省东港 (1963, VII; 1964, VI)。

背鳍 59—62; 臀鳍 50; 胸鳍(右) 8—10; 腹鳍 5—6; 尾鳍 18。侧线鳞 95—98。鳃耙 (下肢) 9—11。

体长为体高 2.2—2.5 倍 (Norman, 1934: 体长为体高 2.67—3 倍), 为头长 4—4.5 倍。头长为眼径 2.4—2.8 倍, 为上颌长 3.7—3.8 (小鱼) 或 3.6—3.7 倍(成年鱼)。

体长形, 软肉质, 侧扁。头中等大。两眼大, 几乎互邻接; 上眼位头背缘, 不达下眼前方; 下眼近邻上唇(上颌骨)。口小。两颌牙尖形, 在两侧为绒毛状, 排成窄带状牙群。下眼前方鼻孔一对, 后鼻孔距眼近; 无眼侧另一对鼻孔距吻端很近。鳃耙稍短, 尖形。

鳞中等大, 在有眼侧为栉鳞, 无眼侧为圆鳞。侧线鳞自鳃盖骨开始为 95—98 个。有眼侧侧线发达, 达尾鳍, 在胸鳍上方有一上端呈水平形的大弯弓部。无眼侧无侧线。

尾鳍中部 12 鳍条分枝, 其他鳍无分枝鳍条, 尾鳍圆矛状。

福尔马林液浸存标本为灰白色。鳍均黑色, 而胸鳍较暗 (Norman, 1934; 胸鳍褐色, 后端淡黑), 尾鳍较淡, 沿背鳍与臀鳍各约有 7 个暗斑, 有时尾鳍有两个暗斑。体无眼侧淡白色, 有黑色斑痕。小标本沿侧线有许多清楚的暗斑。

为生活于热带水深 219.6—457.5 米海区的小型底层海鱼, 最大体长达 145 毫米 (Norman, 1934)。

分布于台湾南部; 西达斯里兰卡, 南达印度尼西亚。

双斑瓦鲽 *Poecilopsetta plinthus* (Jordan et Starks) (图 II-73)

Alaeops plinthus Jordan et Starks, 1907, Proc. U. S. Natn. Mus. 31: 199, fig. 12 (日本骏河湾)。




图 II-73 双斑瓦鲽 *Poecilopsetta plinthus* (Jordan et Starks)
体长 94 毫米, 采自海南省清澜港(王惠民绘改)

Poecilopsetta plinthus, Hubbs, 1915, Proc. U. S. Natn. Mus. 48:474 (鹿儿岛); Norman, 1934, Syst. Monogr. Flatfish. I:392, fig. 282 (横滨等); 郑葆珊, 1962, 南海鱼类志: 982, 图 764 (海南清澜港); Chen (陈兼善) & Weng (翁廷辰), 1965, Biol. Bull. Dep. Biol. Tunghai Univ. 25:14, fig. 7 (台湾东港); 成庆泰等, 1981, 海洋科学集刊 18: 264 (清澜港); 李思忠, 1981(2), 鱼类学论文集 I:16 (亚热带); Shen (沈世傑), 1982, Q. Jl. Taiwan Mus. 35(3—4):201, fig. 3 (东港、大溪); 沈世傑, 1984(2), 台湾鱼类检索: 452, 图 (台湾东北及西南); 李思忠等, 1987, 中国鱼类系统检索: 504, 图 2585 (黄海至南海)。

别名: 瓦鲽(杜亚泉等, 1932)、砖形瓦鲽(成庆泰, 1963)、丕林塞花鱗鲽(陈兼善, 1969)。

检查标本 30 尾, 测量 10 尾; 体长 37.2—135 毫米; 采自江苏吕泗列岛东、浙江宁波东、海南东及榆林港东南等水深 40—200 米海区。