

11.05 倍。头与躯干合长为尾部长的 0.81—1.23 倍。

体延长，稍侧扁。头较小。吻稍突出。眼小而圆，侧中位，外被一层透明的皮膜。眼间隔宽，微凸。鼻孔每侧 2 个；前鼻孔短管状，位近吻端；后鼻孔小圆孔状，位于眼前缘上方。领齿呈钝颗粒状。上颌齿 1 行，较短小。前上颌齿 1 行，较粗大，中间具 2 个齿，周围齿不到 10 个。犁骨齿前面 2 行，后面 1 行，多数为颗粒状。下颌齿外行超过 10 个，前面内侧 2 个。Hatooka (1986) 报道，此种雌鱼齿钝圆锥状，雄鱼前上颌齿尖，前上颌齿及前下颌齿具锯齿。鳃孔较小，呈裂缝状，其长等于或稍大于眼径。肛门位于体腹面中央附近。

体无鳞，皮肤光滑。侧线孔不明显。头部感觉孔 10 个，即眼上部 2 个，眼下部、下颌部各 4 个。

背、臀、尾鳍较发达，相连续。背鳍始于鳃孔前上方。臀鳍始于肛门后方。无胸鳍。

福尔马林浸泡标本体浅黄色，腹部色浅。体侧具 2 纵行不规则大形树枝状斑纹，其间具不规则的网状纹。腹部具不规则的黑褐色斑。

习性 生活在热带、亚热带珊瑚礁附近，经济价值不大。肉具西加毒素，该毒素是鱼食有毒藻类，毒素积累于体内，人食毒鱼后引起中毒。

分布 中国北起台湾北部的野柳，南至南海诸岛的珊瑚岛、永兴岛等有分布；国外分布西起红海及非洲东南岸，东至夏威夷及玻利尼西亚群岛，南起澳大利亚，北至日本鹿儿岛。

(44) 棕斑蛇鳝 *Echidna delicatula* (Kaup, 1856) (图 134)

Poecilophis delicatulus Kaup, 1856, Arch. Naturgeschichte, 22 (1): 67 (Maluku).

Echidna delicatula: Bleeker, 1864, Atlas Ichthyol., 4: 78, pl. 23, fig. 3; Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, 1974, Acta Zool. Sinica, 20 (2): 116 (Islands of South China Sea); Zhang, 1979, Fishes of the South China Sea Archipelago: 46, pl. I, fig. 2 (Yongxing); Chen, 1985, A Synopsis of the Vertebrate of Taiwan: 247, pl. IV: 6 (Taiwan).


英文名 Brindled moray, Mottled moray, Arashi-utsubo (日本)

别名 淡色海鳝 (中国科学院动物研究所, 1974), 棕斑海鳝 (张世义, 1979), 喜乐蝮鱈 (陈兼善, 1985)

形态 测量标本 1 尾，体长 390mm；采自南海诸岛的永兴岛海域。

体长为体高的 17.3 倍，为体宽的 29.0 倍，为头长的 10.1 倍。头长为吻长的 8.6 倍，为眼径的 10.0 倍。尾部长为头与躯干合长的 1.1 倍。

体细长，侧扁。吻略突出，吻长为眼径的 1.3 倍。鼻孔每侧 2 个；前鼻孔短管状，位于上唇前上缘；后鼻孔裂缝状，位于眼前上方。眼小而圆，外被一层透明的皮膜。眼

图 134 棕斑蛇鳝 *Echidna delicatula* (Kaup) (仿张世义, 1979)Fig. 134 *Echidna delicatula* (Kaup) (from Zhang, 1979)

间隔较宽, 宽为眼径的 1.6 倍。口裂较大, 向后可达眼后缘下方。前上颌齿 12 个, 向后排列, 中间 2 齿特别粗大; 上颌齿 2 行, 外行每侧有齿 12 个, 排列密集, 内行每侧有齿 6 个, 排列稀疏。犁骨齿 1 行, 有齿 12 个; 下颌齿细小。鳃孔细小, 水平状, 位于头侧下方。

体完全无鳞。皮肤光滑。侧线孔不明显。

背鳍、臀鳍与尾鳍很发达, 相连续。背鳍始于头部中央处的前上方。臀鳍紧位于肛门的后方。无胸鳍。

体和鳍淡色, 密布不规则淡褐色斑点, 部分斑点连续成条纹; 头前半部无斑点, 且为暗棕褐色; 鳃孔黑色。

分布 中国北起台湾, 南至南海诸岛的永兴岛海域有分布; 国外分布西起印度尼西亚, 菲律宾, 东到萨摩亚, 北到琉球群岛海域。

25. 星斑鳝属 *Siderea* Kaup, 1856

Siderea Kaup, 1856, Arch. Naturgeschichte, 22 (1): 58. Type species: *Siderea pfeifferi* Bleeker, 1853.

别名 星斑鯙属 (台湾)、双犁海鳝属 (伍汉霖等, 1999)

形态 体较延长, 稍侧扁。体长不及体高的 30 倍。头中等大。吻短, 不弯曲。齿圆锥状, 且具有两行犁骨齿。背、臀鳍发育正常, 背鳍始点在鳃孔之前, 臀鳍始点在肛门之后。无胸鳍。鳃孔小, 裂缝状。

种类 现知全世界有 5 种, 中国有 2 种。