

别名 斑纹裸鯮 (陈兼善, 1986), 石纹尾鳢 (伍汉霖等, 1999)

形态 无标本。依据 Fowler (1932) 的描述。

全长为体高的 19—26 倍, 为头长的 7.6—11 倍; 体长为头长的 3—4 倍。头长为眼径的 7.35—18 倍, 为口裂长的 7.87—8.01 倍。尾部长为头与躯干长的 1.2—1.5 倍。体黄色、褐色或灰褐色, 腹部色浅, 有细或粗的黑色大理石斑纹。栖息在珊瑚礁的浅海处, 最长可达 600mm 以上。

分布 中国台湾、上海的东海海域有分布; 国外分布于印度洋的桑给巴尔至太平洋中部的萨摩亚, 塔希堤海域。

(35) 小鳍裸海鳢 *Uropterygius micropterus* (Bleeker, 1852) (图 125)

Muraena micropterus Bleeker, 1852, Nat. Tijds. Ned. Indië, 3: 298 (Indonesia).

Uropterygius micropterus: Masuda, 1984, Fishes of Japanese Archipelago, 26 (Japan); Shen, 1993, Fishes of Taiwan: 99, fig. 19: 5 (Maobitou, Hengchun); Chen *et al.*, 1994, Zoolog. Stud., 33 (1): 62, fig. 1: 41, fig. 11: 41 (Taiwan).




图 125 小鳍裸海鳢 *Uropterygius micropterus* (Bleeker) (仿 Hatooka, 1993)

Fig. 125 *Uropterygius micropterus* (Bleeker) (from Hatooka, 1993)

英文名 Ami-kikai-utsubo (日本)

别名 小鳍鳍尾鯮 (沈世杰, 1993), 短鳍尾鳢 (伍汉霖等, 1999)

形态 无标本。依据沈世杰 (1993) 的描述。

全长为体长的 2.2—3.0 倍。体长为体高的 17.2—22.5 倍, 为头长的 7.6—8.5 倍。椎骨 115—120。

鳃孔前方侧线孔 1 个。颌齿 2 行, 内行齿大且少, 细针状, 前上颌中央具 2 个可倒性齿。犁骨齿 1 行, 小齿。

头及体下部白色或浅灰色, 上部则为灰色或褐灰色, 体表被不规则细网状纹。

分布 中国产于台湾恒春、猫鼻头; 国外分布西起印度洋, 东至太平洋中部海域。

(36) 巨头裸海鳢 *Uropterygius macrocephalus* (Bleeker, 1865) (图 126)

Gymnomuraena macrocephalus Bleeker, 1865, Ned. Tijds. Dierk., 2: 54 (Anwen, Indonesia).