

无背鳍与脂鳍。臀鳍基较长，具鳍条 65—66 根，后端不与尾鳍相连，起点距尾鳍基远大于距胸鳍基后端。胸鳍长，无骨质硬刺，第一根不分枝鳍条极少骨化而柔软，前后缘光滑，末端超过臀鳍起点。腹鳍小。距胸鳍基后端大于距臀鳍起点。尾柄细，其高与吻长相等。肛门位于腹鳍基后端与臀鳍起点之中间。尾鳍深分叉。

分布 澜沧江下游。

滨河缺鳍鲃 *Kryptopterus bleekeri* Günther (图 49)

Cryptopterus bleekeri Günther, 1864, *Cat. Fish. Br. Mus.* 5: 44 (泰国)。

Kryptopterus bleekeri: Smith, 1945, *Bull. U. S. natn. Mus.* (188): 344 (泰国)。

Kryptopterus deiguani: 陈湘舜, 1977, 水生生物学集刊 6 (2): 212 (西双版纳)。




图 49 滨河缺鳍鲃 *Kryptopterus bleekeri* Günther

测量标本 4 尾 (由中国科学院昆明动物研究所惠借); 体长 149—240 mm; 采自云南勐仑。

无背鳍; 臀鳍条 ii-81—84; 胸鳍 i-13—16; 腹鳍 i-7—8。鳃耙 18—19。

体长为体高的 4.9—5.3 倍, 为头长的 4.6—5.1 倍, 为尾柄长的 35—51 倍。头长为吻长的 2.7—3.3 倍, 为眼径的 7—8.3 倍, 为眼间距的 1.4—2 倍, 为头宽的 1.5—1.7 倍, 为口裂宽的 1.8—1.9 倍。尾柄高为尾柄长的 2.4—3 倍。

体延长, 很侧扁。头小, 宽且纵扁。吻长, 纵扁而圆钝。口较小, 次上位。口裂较浅, 口角至眼前缘的距离略小于吻长之半。下颌略突出于上颌。上、下颌具绒毛状细齿, 形成新月形齿带, 犁骨齿形成等宽的弧形齿带。眼中等大, 位于头前侧下方。前后鼻孔相隔较远, 前鼻孔呈短管状。颌须短而细, 后端超过眼后缘, 颌须达眼前缘。鳃耙细长, 较密。鳃孔大。鳃盖膜不与鳃峡相连。

无背鳍与脂鳍。臀鳍基特长, 鳍条约 81 根, 后端不与尾鳍相连, 起点距尾鳍基远大于距胸鳍基后端。胸鳍无硬刺, 鳍条末端超过臀鳍起点。腹鳍起点至胸鳍基后端大于距臀鳍起点。肛门位于腹鳍基后端与臀鳍起点之中间。尾鳍深分叉, 下叶略长。

浸制标本 呈褐黄色, 体侧色浅。

分布 澜沧江下游。

叉尾鲇属 *Wallago* Bleeker, 1851

Wallago Bleeker, 1851, *Natuurk. Tijdschr. Ned.-Indie*: 2: 194 (模式种 *Silurus attu* Bleeker)

Wallagonia Myers, 1938, *Copeia*: (2): 98 (模式种 *Wallago leerii* Bleeker)。

体延长，侧扁。头宽。吻纵扁。口端位。口裂深，后伸超过眼后缘。上、下颌具绒毛状细齿，形成宽齿带，犁骨齿左右各形成一条短细的斜齿带。眼位于口裂后端之上方。前后鼻孔相隔较远，前鼻孔呈管状。颌须与颊须各1对。背鳍短，无骨质硬刺。无脂鳍。臀鳍长，后端不与尾鳍相连。胸鳍无硬刺。鳃盖膜不与鳃峡相连。

分布 澜沧江。

我国产1种。

叉尾鲇 *Wallago attu* (Bloch et Schneider) (图 50)

Silurus attu Bloch et Schneider, 1801, *Syst. Ichthyol.*: 378.

Wallago attu: Bleeker, 1862, *Atlas Ichthyol.*: 79; 张春霖, 1960, 中国鲇类志: 10; 陈湘旻, 1977, 水生生物学集刊 6 (2): 212 (景洪)。




图 50 叉尾鲇 *Wallago attu* (Bloch et Schneider)

测量标本 5尾 (由中国科学院昆明动物所惠借); 体长 275—361 mm; 采自云南省景洪县的勐罕。

背鳍 i-4; 臀鳍条 i-92—96; 胸鳍条 i-12—14; 腹鳍条 i-8—9。鳃耙 26—29。

体长为体高的5.6—6.5倍，为头长的4.9—5倍，为尾柄长的110.6—136.3倍，为前背长的3.5—3.6倍。头长为吻长的2.5—2.7倍，为眼径的8.9—9.3倍，为眼间距的