

端为近。尾鳍微内凹，上叶略长。

分布 西江、淡水河等水系。

短尾拟鲇 *Pseudobagrus brericaudatus* (Wu) (图 32)

Leiocassis brericaudatus Wu 1930, *Sinensia* 1 (6): 81 (重庆).

Pseudobagrus brericaudatus: 张春霖, 1960, 中国鲇类志: 22—23 (四川重庆及福州).




图 32 短尾拟鲇 *Pseudobagrus brericaudatus* (Wu)

测量标本 5 尾；体长 104—194mm；采自重庆木洞，嘉陵江，云南沾益。

背鳍条 I - 6—7；臀鳍 iii - 14—15；胸鳍条 I - 7—9；腹鳍条 i - 5。鳃耙 11—12。游离脊椎骨 37—39。

体长为体高的 5—5.8 倍，为头长的 4.3—4.4 倍，为尾柄长的 6.3—7.4 倍，为前背长的 2.8—2.9 倍。头长为吻长的 2.3—2.8 倍，为眼径的 6—6.1 倍，为眼间距的 2.2—2.3 倍，为头宽的 1.2—1.3 倍，为口裂宽的 2.1—2.2 倍。尾柄长为尾柄高的 1.7—2.1 倍。

体延长，背部略隆起，后部侧扁。头纵扁，被以皮肤。吻圆钝。口下位，横裂且宽。唇厚，在口角处形成发达的唇褶。上颌很突出于下颌。上、下颌及腭骨均具绒毛状细齿，形成齿带。眼小，被皮膜覆盖，侧上位，位于头的前部。前后鼻孔相隔较远，前鼻孔呈极短管状，后鼻孔呈裂缝状。须细短，鼻须位于后鼻孔的前缘，后伸达眼后缘；颌须超过眼后缘接近胸鳍起点；外侧颌须长于内侧颌须，后伸超过眼后缘。鳃孔较大。鳃盖膜不与鳃峡相连。鳃耙细短。

背鳍骨质硬刺前缘光滑，后缘具弱锯齿，起点距吻端大于距脂鳍起点。脂鳍长，基部位于背鳍基后端至尾鳍基中央。臀鳍起点位于脂鳍起点垂直下方略前，至尾鳍基的距离不及至胸鳍基后端。胸鳍侧下位，前缘粗糙，后缘具锯齿 12—13 枚，鳍条末端不达腹鳍。腹鳍起点位于背鳍基后端垂直下方之后，距胸鳍基后端远大于距臀鳍起点，鳍条

后伸超过臀鳍起点。肛门距臀鳍起点较距腹鳍基后端为近。尾鳍分叉，中央最短鳍条长约为外缘最长鳍条的 $2/3$ ，叶后端圆钝。

活体黄褐色，体侧色浅，腹部黄白色。

分布 长江、闽江水系。

峨眉拟鲮 *Pseudobagrus omeihensis* (Nichols)

Leiocassis omeihensis Nichols, 1941, *Am. mus. Novit.* (1107): 1—3 (四川峨眉)。

Pseudobagrus omeihensis: 成庆泰、郑葆珊, 1987, 中国鱼类系统检索 (上册): 216。

无标本 摘自原始描述。

体长 103mm; 背鳍条 I-7; 臀鳍条 15。

体长为体高的 3.6 倍; 为头长的 4.3 倍。头长为吻长的 2.7 倍, 为眼径的 7 倍。

体较延长。体颇高, 体长为体高的 4 倍以下。头骨被皮肤覆盖。吻钝略凸。口下位, 横裂。唇厚。须短小, 颌须末端后伸略过眼后缘。

背鳍骨质硬刺细小, 前、后缘光滑。脂鳍前部低, 后部渐高, 后端游离, 鳍基长为游离部分长的 4.5 倍。臀鳍较短, 鳍条 15 根。胸鳍硬刺后缘具锯齿。尾鳍圆形。

头背部呈灰黑色, 颌至腹部灰白色, 脂鳍和尾鳍色暗。背鳍灰白色, 鳍边缘色暗。臀鳍中央灰白, 基部和边缘为暗色。

分布 四川峨眉。

鲮属 *Mystus* Scopoli, 1777

Mystus Scopoli, 1777, *Int. Hist. Nat.*: 451 (模式种 *Bagrus halepensis* Cuvier et Valenciennes = *Silurus pelusius* Solander)

Hemibagrus Bleeker, 1862, *Versl. Med. Akad. Wetensch.*, Amsterdam 14: 392 (模式种 *Bagrus nemurus* Cuvier et Valenciennes)。

Aoria Jordan, 1919, *Proc. Acad. nat. Sci. Philad.* 70: 341 (模式种 *Bagrus lanarri* Cuvier et Valenciennes)。

Aorichthys Wu, 1939, *Sinensia* 10: 131 (代 *Aoria*)。

体中等延长, 裸。头纵扁或侧扁。头顶光滑或粗糙, 正中有一纵沟。上枕骨棘被皮肤或略裸。眼小, 侧上位, 眼缘游离。鼻孔小, 2 对, 前后鼻孔分离, 前鼻孔有须。上颌突出于下颌。上、下颌及腭骨具绒毛状细齿。须 4 对。鼻须 1 对, 颌须长于头长, 末端超过胸鳍之后; 颏须 2 对; 内侧颏须短于头长, 外侧颏须长度不一。背鳍具骨质硬刺, 前后缘光滑, 具鳍条 7 根。脂鳍基长, 甚长于臀鳍基, 后缘游离。臀鳍条 9—16 根。胸鳍硬刺前后缘或仅后缘具锯齿。

我国产 4 种。