

分布 闽江、长江、黄河水系。

短臀拟鲿 *Pseudobagrus brevianalis* Regan (图 28)

Pseudobagrus brevianalis Regan, 1908, Ann. Mag. nat. Hist. 1 (8): 151 (台湾日月潭)。

Leiocassis brevianalis (Regan): 张春霖, 1960, 中国鲇类志: 30—31 (台湾、福州)。




图 28 短臀拟鲿 *Pseudobagrus brevianalis* Regan

测量标本 1尾; 体长 100 mm; 采自福州。

背鳍条 I-6; 臀鳍条 18; 胸鳍条 I-7; 腹鳍条 i-5。

体长为体高的4.8倍, 为头长的4.2倍, 为尾柄长的6倍, 为前背长的3.3倍。头长为吻长的2.5倍, 为眼径的6倍, 为眼间距的2.2倍。尾柄长为尾柄高的1.7倍。

体延长, 后部侧扁。头较宽, 被以光滑皮肤。吻宽且钝圆。口宽阔, 次下位。唇厚。前后鼻孔相隔较远, 前鼻孔呈短管状, 后鼻孔前缘有鼻须, 末端后伸可及眼后缘。颌须中等长, 末端伸及胸鳍起点。外侧颌须长于内侧颌须。侧线完全, 位于体侧中央。鳃孔大, 鳃盖膜不与鳃峡相连。

背鳍具骨质硬刺, 前后缘光滑, 起点距吻端略大于距脂鳍起点。脂鳍基部位于背鳍基后端至尾鳍基中央。臀鳍起点位于脂鳍起点垂直下方之后, 鳍基长略短于脂鳍基, 距尾鳍基大于至胸鳍基后端。胸鳍硬刺前缘光滑, 后缘具锯齿, 鳍条后伸不及腹鳍。腹鳍起点位于背鳍基后端垂直下方之后, 距胸鳍基后端大于距臀鳍起点。肛门距臀鳍起点较距腹鳍基后端为近。尾鳍后缘略内凹。

体背呈浅紫色, 体侧以下色浅。

分布 台湾、福州。

凹尾拟鲿 *Pseudobagrus emarginatus* (Regan) (图 29)

Leiocassis emarginatus Regan, 1913, Ann. Mag. nat. Hist. 11 (8): 553 (四川嘉定); 张春