

距较唇鳍为宽。须1对，位口角，较短，长度为眼径的0.5—0.7倍。眼较大，侧上位，眼间宽广，稍隆起。前眶骨、下眶骨及前鳃盖骨边缘具1排粘液腔。体鳞较小。侧线完全，略平直。

背鳍长，末根不分枝鳍条为光滑的硬刺，长且粗壮，其长几与头长相等，起点距吻端较至尾鳍基的距离为小。胸鳍后端略钝，后伸不达腹鳍起点。腹鳍短小，起点稍后于背鳍起点，末端后伸远不及肛门及臀鳍起点。肛门紧靠臀鳍起点。臀鳍较短，起点距尾鳍基较至腹鳍起点为近，其末端不达尾鳍基。尾鳍分叉，上下叶等长，末端钝圆。

下咽骨较粗壮，主行下咽齿顶端钩曲，外侧2行甚纤细。鳃耙发达，粗长，为长锥状。肠管短，等于或略长于体长，为体长的1.0—1.1倍。鳔大，2室，前室卵圆形，后室末端尖细，呈长锥形，后室长为前室的1.8—2.4倍。腹膜银灰色。

体背及体侧上部青灰色，腹部白色。体侧具多数大小不等的黑褐色斑点，沿体侧中轴侧线的稍上方处有7—11个黑色大斑点。背鳍和尾鳍具多数小黑点，其他各鳍灰白。

分布较广，自长江以南至黑龙江水系均有。

钱江鮈 *Hemibarbus qianjiangensis* Yu, 1990 (图139)

Hemibarbus qianjiangensis Yu (俞泰济)，刊于陈马康等，1990，钱塘江鱼类资源：123（浙江桐庐）。

检视标本5尾；体长335—485mm；采自浙江桐庐。测量1尾，体长345mm。

背鳍iii-7；臀鳍iii-6；胸鳍i-16-17；腹鳍i-8-9。侧线鳞49 $\frac{7-8}{5-6-v}$ 51；背鳍前鳞16-17；围尾柄鳞20。第一鳃弓外侧鳃耙7-10；下咽齿3行，1·3·5-5·3·1。




图139 钱江鮈 *Hemibarbus qianjiangensis* Yu (依俞泰济, 1990)

体长为体高的3.8—4.6倍，为头长的4.0—4.8倍，为尾柄长的4.9—6.0倍，为尾柄高的9.0—11.3倍。头长为吻长的2.3—2.8倍，为眼径的4.5—6.4倍，为尾柄长的

1.0—1.3倍，为尾柄高的1.8—2.3倍。背鳍刺长为头长的0.9—1.1倍。须长为眼径的1.5—2.2倍。（以上数据参考原始记载）。

体长，侧扁，腹部圆，尾柄较长。头中等大，其长略小于体高。吻较长，突出，吻端稍圆。口下位，深弧形，口裂后伸达鼻孔下方。唇薄，上唇简单，下唇侧叶不发达，较狭窄，颐部中央有三角形的突起，较发达。唇后沟中断。须1对，位口角，较粗，特别长，其长度远超过眼径。眼中等大，侧上位，眼间隔宽广，稍隆起。前眶骨、下眶骨具粘液腔，前鳃盖骨后缘的粘液腔极不明显。体被圆鳞。侧线平直，伸达尾鳍基部。

背鳍末根不分枝鳍条为光滑的硬刺，长且粗壮，长度一般大于头长，背鳍起点位于腹鳍前方，距吻端较至尾鳍基为近。胸鳍较短，末端不达背鳍起点的下方。腹鳍起点距胸鳍基部较至臀鳍起点为近。肛门紧靠臀鳍起点。臀鳍起点距腹鳍起点较至尾鳍基为近。尾鳍分叉，上下叶等长或下叶稍长，末端尖。

下咽骨粗壮，主行咽齿末端钩曲，外侧2行齿纤细。鳃耙较发达。肠管与体长相等或长于体长，为体长的1.0—1.35倍。鳔大，2室，后室长为前室的1.3—1.7倍。腹膜灰白色，带有银色光泽。

全体黄褐色，腹部浅黄带白色。背部和体侧具有多数排列规则、大小一致的黑褐色斑点。背、尾鳍均具多数小黑点，其他各鳍无斑点。

分布于钱塘江下游。

大刺鲃 *Hemibarbus macracanthus* Lo, Yao et Chen, 1977 (图140)

Hemibarbus macracanthus Lo, Yao and Chen (罗云林、乐佩琦、陈宜瑜), 刊于伍献文等, 1977, 中国鲤科鱼类志: 448 (广西桂平、百色、龙州); 林再昆, 1981, 广西淡水鱼类志: 114 (广西崇左、南宁等)。

测量标本7尾: 体长193—295mm; 采自广西桂平、百色、龙州。

背鳍iii-7; 臀鳍iii-6; 胸鳍i-19-20; 腹鳍i-8。侧线鳞49 $\frac{7.5-8}{4-5-v} 51$; 背鳍前鳞13—15; 围尾柄鳞18—20。第一鳃弓外侧鳃耙8—9。下咽齿3行, 1·3·5—5·3·1。脊椎骨4+42—43。

体长为体高的3.5—3.9倍，为头长的3.9—4.0倍，为尾柄长的5.6—6.7倍，为尾柄高的8.2—9.4倍。头长为吻长的2.3—2.4倍，为眼径的3.9—4.2倍，为眼间距的3.1—3.4倍，为尾柄长的1.4—1.6倍，为尾柄高的2.1—2.4倍。背鳍刺长为头长的1.2—1.3倍。

体长，侧扁，头后背部显著隆起，至背鳍起点处为最高，腹部圆。头稍侧扁。吻长，略尖，其长与眼后头长几相等或稍长。口下位，马蹄形。唇薄，下唇侧叶狭窄，颐部正中有三角形突起。唇后沟中断。须1对，位口角，长度略小于眼径。眼较大，稍突出。眼间宽广，隆起。前眶骨、下眶骨及前鳃盖骨边缘具1排粘液腔。体被圆鳞，鳞片较小。侧