

分布于北盘江。

四川爬岩鳅 *Beaufortia szechuanensis* (Fang), 1930 (图 309)

Gastromyzon szechuanensis Fang (方炳文), 1930, *Sinensia*, 6 (4): 36 (四川峨眉); Nichols, 1943, *Nat. Hist. Centrel Asia*, 9: 232; Chen and Liang (陈兼善、梁润生), 1949, *Quart. J. Taiwan Mus.*, 2 (4): 167.

Beaufortia szechuanensis: Hora, 1932, *Men. Indian Mus.*, 12 (2): 319; Chang (张孝威), 1944, *Sinensia*, 15 (1—6): 55 (四川乐山); Silas, 1952, *Rec. Indian Mus.*, 50: 236 (四川乐山、峨眉); 陈宜瑜, 1980, 水生生物学集刊, 7 (1): 113 (四川乐山、金佛山); 谢家骅 (见伍律等), 1989, 贵州鱼类志: 219 (纳雍); 李贵禄 (见丁瑞华等), 1994, 四川鱼类志: 427 (龚嘴、巫溪、鳧鱼河).

测量标本 9 尾; 体长 42—64mm; 采自四川乐山、金佛山。

背鳍 iii-7; 臀鳍 ii-5; 胸鳍 i-25—27; 腹鳍 i-17—20。侧线鳞 98—106。




图 309 四川爬岩鳅 *Beaufortia szechuanensis* (Fang)

体长为体高的 5.8—8.2 倍, 为体宽的 4.2—4.8 倍, 为头长的 5.0—6.0 倍, 为尾柄长的 8.2—12.9 倍, 为尾柄高的 10.4—13.2 倍, 为背鳍前距的 1.9—2.1 倍, 为腹鳍前距的 2.6—3.1 倍。头长为头高的 1.0—2.0 倍, 为头宽的 0.7—1.0 倍, 为吻长的 1.7—2.0 倍, 为眼径的 4.0—6.5 倍, 为眼间距的 1.6—2.0 倍。尾柄长为尾柄高的 1.0—1.4 倍。头宽为口宽的 3.0—3.7 倍。

体稍延长，前段较平扁，后段渐侧扁，背缘稍隆起，腹面平坦。头很宽扁。吻端圆钝，边缘薄；吻长大于眼后头长。口下位，中等大，呈弧形。唇肉质，上唇无明显乳突；下唇中部具一深缺刻，左右唇片边缘光滑或各具3个不显著的分叶状乳突，上下唇在口角处相连。下颌前缘稍外露，表面具放射状的沟和脊。上唇与吻端之间具吻沟，延伸到口角。口角沟较深，仅限于口角处。吻沟前的吻褶发达，分3叶，约等大，叶端圆钝，呈半圆状突出。吻褶叶间具2对小吻须，外侧对稍大。口角须1对，约与外侧吻须等大。鼻孔较大，具鼻瓣。眼中等大，侧上位。眼间宽阔，平坦。鳃裂极小，仅限于头的背侧面。鳞细小，头部及偶鳍基部的背侧面和腹鳍基部之前的腹面无鳞。侧线完全，自体侧中部平直地延伸到尾鳍基部。

背鳍基长约等于吻长，起点约在吻端至尾鳍基之间的中点，约与腹鳍基部的后缘相对，臀鳍基长不足吻长的一半，不分枝鳍条不变粗变硬，末端压倒后达到尾鳍基部。偶鳍平展。胸鳍基长约等于头长，起点在眼前缘的垂直下方，外缘椭圆形，末端盖过腹鳍起点。腹鳍起点至臀鳍起点的距离远大于至吻端的距离，基部背面具1发达的肉质瓣膜，左右腹鳍条的最末2—3根分枝鳍条在中部斜向完全愈合，后缘无缺刻，末端显著不达肛门。肛门约在腹鳍基部至臀鳍起点间的中点稍后。尾鳍长约等于头长，末端斜截，下叶稍长。

固定标本体背侧棕褐色，腹面浅黄色，各鳍均似所在身体部位的颜色。

分布于长江上游及其支流清江。

多鳞爬岩鳅 *Beaufortia polylepis* Chen, 1982 (图 310)

Beaufortia polylepis Chen (陈银瑞), 1982, 动物学研究, 3 (4): 397 (云南宜良); 陈宜瑜、郑慈英 (见郑慈英等), 1989, 珠江鱼类志: 258; 陈银瑞 (见褚新洛等), 1990, 云南鱼类志 (下册): 88 (宜良).

测量模式标本1尾; 体长39mm; 采自云南宜良。

背鳍 iii-8; 臀鳍 ii-5; 胸鳍 i-27; 腹鳍 i-17。侧线鳞 83。

体长为体高的5.6倍，为体宽的3.9倍，为头长的5.2倍，为尾柄长的7.8倍，为尾柄高的11.1倍，为背鳍前距的2.0倍，为腹鳍前距的2.8倍。头长为头高的1.8倍，为头宽的0.9倍，为吻长的1.7倍，为眼径的5.0倍，为眼间距的1.5倍。尾柄长为尾柄高的1.4倍。头宽为口宽的5.0倍。

体稍延长，前段较平扁，后段渐显侧扁，背缘呈弧形隆起，腹面平坦。头较宽扁，吻端圆钝，边缘薄。吻长大于眼后头长。口下位，较小，呈弧形。唇肉质，上唇无明显乳突；下唇中部稍凹，左右唇片边缘光滑，前缘稍游离；上下唇在口角处相连。下颌前缘稍外露，表面具放射状的沟和脊。上唇与吻端之间具吻沟，延伸到口角。吻沟前的吻褶分3叶，约等大，叶端圆钝。吻褶叶间具2对小吻须，外侧1对极短小，内侧1对稍