

齿。背鳍起点约与腹鳍起点相对，距吻端较尾鳍基为近。胸鳍末端不达腹鳍，相距 1—2 枚鳞片。腹鳍末端距肛门 1—2 枚鳞片。臀鳍紧接肛门之后，外缘几乎截，尾鳍深叉形。

鳃耙短钝，排列稀疏。下咽齿顶端尖而弯曲。鳔 2 室，后室接近前室的 2 倍。腹膜黑色。

浸泡标本体黄褐色，背部及体侧大多数鳞片基部有新月形的黑褐色斑。各鳍浅黄色，背鳍前缘呈黑色，背鳍外缘及大多数尾鳍内缘有黑色窄边。

分布于澜沧江下游及其流水系。

经对照 Fowler (1935) 的 *M. chilopterus* 原始描记，臀鳍内凹，基部具新月状黑褐色斑的鳞片呈零星分布，鳃耙 14。褚新洛等记载的 *M. chilopterus* 臀鳍外缘斜截，鳃耙 11—13，检视标本体侧多数鳞片基部具新月状黑褐色斑，与 *M. marginatus* 没有本质区别。我们暂将褚新洛等的 *M. chilopterus* 作为 *M. marginatus* 的同物异名处理。

### 细尾长臀鲃 *Mystacoleucus lepturus* Huang, 1979 (图 110)

*Mystacoleucus lepturus* Huang, 1979, 动物分类学报, 4 (4): 419 (勐腊、景洪、景谷); 褚新洛、崔桂华, 1989, 云南鱼类志 (上册): 228 (勐腊、景谷)。

测量标本 33 尾; 体长 50—83mm, 采自云南勐腊、景谷。

背鳍 iv-8; 臀鳍 iii-8—9; 胸鳍 i-12—15; 腹鳍 ii-8。侧线鳞  $32 \frac{5-6}{2.5-3-v} 36$ , 背鳍前鳞 8—10, 围尾柄鳞 14。第一鳃弓外鳃耙 6—9, 下咽齿 3 行,  $2 \cdot 3 \cdot 4-4 \cdot 3 \cdot 2$ 。




图 110 细尾长臀鲃 *Mystacoleucus lepturus* Huang

体长为体高的 3.2—4.0 倍，为头长的 4.2—5.1 倍，为尾柄长的 4.6—4.8 倍，为尾柄高的 9.0—10.8 倍。头长为吻长的 3.1—4.1 倍，为眼径的 2.7—3.4 倍，为眼间距的 2.2—3.0 倍。尾柄长为尾柄高的 1.7—2.2。



体延长而侧扁，尾柄细长。吻钝，稍向前突出，吻皮下垂，止于上唇的基部，吻侧于前眶骨前缘有一斜沟，与唇后沟相通。口小，亚下位，口裂伸至鼻孔后缘的正下方。唇薄，包在颌的外表，唇与颌之间有缢痕，上下唇在口角处相连，唇后沟伸至颈部，左右不相通。须 1 对，为口角须，长不及眼径的  $1/2$ 。鳃盖膜在前鳃盖骨后缘的正下方连于峡部。鳞片较大而薄。背鳍和臀鳍基具鳞鞘，腹鳍基外侧有一尖长的腋鳞，其上又有一较小鳞片。侧线完全，入后略下弯，后径行于尾鳍基正中。

背鳍外缘内凹，起点前有一平卧的倒刺，末根不分枝鳍条为硬刺，后缘具锯齿。背鳍起点与腹鳍起点相对或前者稍靠前，距吻端较距尾鳍基为近。胸鳍末端距腹鳍起点 1—3 枚鳞片。腹鳍末端达到或接近肛门。臀鳍紧接肛门之后，内缘内凹，尾鳍深叉形。

鳃耙短小，排列稀疏。下咽齿顶端尖而钩曲。鳔 2 室，前室近圆形，后室细长。腹膜黑色。

浸泡标本体褐黄色，背鳍前鳞基部有半月状黑褐色斑，体侧零星散布着有半月状黑色斑。各鳍浅黄色，背鳍刺及背鳍外缘为黑色，尾鳍内缘有黑色窄边。

分布于澜沧江下游及其支流。