

浅黄色沾灰，臀鳍浅黄色。

分布于云南丽江漾弓江，属金沙江水系。

宁蒗裂腹鱼 *Schizothorax (Racoma) ninglangensis* Wang, Zhang et Zhuang, 1981
(图 191)

Schizothorax ninglangensis Wang, Zhang and Zhuang (王幼槐、张开翔、庄大栋), 1981, 动物分类学报, 6 (3): 329 (云南泸沽湖); 陈宜瑜等, 1982, 动物学报, 28 (3): 219 (泸沽湖).

Schizothorax (Racoma) ninglangensis: 莫天培, 1989, 见褚新洛等, 云南鱼类志 (上册): 306 (泸沽湖).

测量标本 7 尾; 体长 119—221 mm; 采自云南省宁蒗泸沽湖。

背鳍 iii-7—8; 臀鳍 iii-5; 胸鳍 i-18—20; 腹鳍 i-9。侧线鳞 $94 \frac{25-28}{22-v} 106$ 。第一鳃弓外侧鳃耙 15—18, 内侧 21—22。下咽齿 3 行, $2 \cdot 3 \cdot 5 - 5 \cdot 3 \cdot 2$ 或 $2 \cdot 3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 \cdot 2$ 。脊椎骨 $4 + 42 - 43$ 。




图 191 宁蒗裂腹鱼 *Schizothorax (Racoma) ninglangensis* Wang, Zhang et Zhuang

体长为体高的 3.8—4.3 (4.0) 倍, 为头长的 3.5—3.9 (3.7) 倍, 为尾柄长的 5.9—6.6 (6.1) 倍, 为尾柄高的 9.7—11.1 (10.5) 倍。头长为吻长的 3.0—3.6 (3.2) 倍, 为眼径的 4.6—6.9 (5.5) 倍, 为眼间距的 3.4—4.0 (3.7) 倍, 为吻须长的 7.8—12.3 (10.1) 倍, 为口角须长的 7.1—10.5 (8.3) 倍。尾柄长为尾柄高的 1.6—1.8 (1.7) 倍。

体延长而侧扁, 背腹缘较隆起。头较大, 呈锥形。吻稍尖。口端位, 口裂呈弧形; 下颌向上倾斜, 内侧具薄层角质, 不形成锐利角质前缘; 下唇不发达, 分为左、右两

叶，均细狭，表面光滑无乳突；唇后沟不连续。须2对，口角须稍长于吻须，其长度均小于眼径；吻须末端后伸仅达鼻孔前缘之垂直下方，口角须末端后伸达鼻孔后缘至眼前缘之间的垂直下方。眼中等大，侧上位；眼间稍窄，略圆凸。体被细鳞，自峡部后之胸腹部具明显鳞片。侧线完全，近直形或在体前部略下弯，后伸入尾柄之正中。

背鳍末根不分枝鳍条稍强，其后缘每侧具明显锯齿14—19枚，背鳍起点至吻端之距离较其至尾鳍基部为远。腹鳍起点与背鳍末根不分枝鳍条或第一分枝鳍条之基部相对，其末端后伸略超过腹鳍起点至臀鳍起点之间距离的1/2处，远离肛门。肛门紧位于臀鳍起点之前。胸鳍末端后伸约达胸鳍起点至腹鳍起点之间的1/2处。臀鳍末端后伸远离尾鳍基部。尾鳍叉形，末端略尖。

下咽骨狭窄，呈弧形，其长度为宽度的3.6—4.2倍；下咽齿细圆，顶端尖而稍钩曲，咀嚼面呈匙状。肠管短，其长度为体长的1.8—1.9倍。鳔2室，其后室长为前室长的1.5—2.6倍。腹膜黑色。

新固定标本体侧蓝灰色，杂有许多黑褐色斑点及斑块，腹侧灰白或浅黄色，背鳍及尾鳍灰色，杂有若干黑褐色细斑，胸鳍灰褐色，腹鳍及臀鳍浅黄色或沾褐。

栖息于泸沽湖内各水层，杂食性。每年6—8月在湖滩泉水出口附近产卵。个体较大，数量多，是产区的主要经济鱼类。

分布于云南和四川交界的泸沽湖。

小口裂腹鱼 *Schizothorax (Racoma) microstomus* Huang, 1982 (图192)

Schizothorax microstomus Huang (黄顺友), 1982, 动物学报, 28 (3): 219 (云南泸沽湖).

Schizothorax luguhuensis Wang, Gao and Zhang (王幼槐、高礼存、张开翔), 1981, 动物分类学报, 6 (3): 330 (部分副模, 云南泸沽湖).

Schizothorax (Racoma) microstomus: 莫天培, 1989, 见褚新洛等, 云南鱼类志(上册): 308 (泸沽湖).

测量标本10尾；体长140—299 mm；采自云南省宁蒗泸沽湖。

背鳍iii-7—8；臀鳍iii-5；胸鳍i-17—19；腹鳍i-8—9。侧线鳞98 $\frac{24-26}{19-20-v}$ 127。第一鳃弓外侧鳃耙19—23，内侧25—33。下咽齿3行， $2 \cdot 3 \cdot 5 - 5 \cdot 3 \cdot 2$ 。脊椎骨4+40—42。

体长为体高的4.0—4.8(4.5)倍，为头长的3.8—5.1(4.7)倍，为尾柄长的4.9—6.0(5.5)倍，为尾柄高的10.0—12.0(11.3)倍。头长为吻长的3.0—3.5(3.2)倍，为眼径的3.8—5.6(4.8)倍，为眼间距的2.5—3.7(3.0)倍，为吻须长的7.3—17.0(13.8)倍，为口角须长的6.2—12.0(9.8)倍。尾柄长为尾柄高的1.7—2.4(2.1)倍。