

末端不达尾鳍基。尾鳍叉形，其最长鳍条约为中央最短鳍条的 2.5 倍。

下咽齿宽短，下咽齿基部稍圆，上端侧扁，齿冠斜截。鳃耙三角形，片状，排列紧密。鳔 2 室，前室椭圆形，后室稍细长，其长约为前室的 1.5 倍。腹膜灰黑色。

鲜活时体带蓝绿色，固定标本体青黑色，背部较深而腹部灰白色，体侧大部分鳞片除基部有深灰黑色新月形斑点之外，均有黑色外框。各鳍浅灰色。

分布于长江上游的干支流中。

### 滇华鲮 *Sinilabeo lemassoni* (Pellegrin et Chevey), 1936 (图 112)

*Varicorhinus lemassoni* Pellegrin et Chevey, 1936, *Bull. Soc. Zool. Fr.*, **61**: 19.

*Sinilabeo rendahli lemassoni*: 伍献文等, 1977, 中国鲤科鱼类志 (下卷): 336 (云南元江); 褚新洛等, 1989, 云南鱼类志 (上册): 253 (河口).

测量标本 3 尾; 体长 145—340mm; 采自云南元江。

背鳍 iii-11—12; 臀鳍 iii-5; 胸鳍 i-18; 腹鳍 i-8。侧线鳞  $46 \frac{8}{7-v} 47$ ; 背鳍前鳞 21—23; 围尾柄鳞 24。下咽齿 3 行, 2·4·5—5·4·2。第一鳃弓外侧鳃耙约 49—55。脊椎骨数 4+39。




图 112 滇华鲮 *Sinilabeo lemassoni* (Pellegrin et Chevey)

体长为体高的 2.9—3.5 倍，为头长的 4.6—4.9 倍，为尾柄长的 5.1—5.8 倍，为尾柄高的 5.7—6.8 倍。头长为吻长的 2.0—2.2 倍，为眼径的 5.2—7.0 倍，为眼间距的 1.9—2.1 倍。尾柄长为尾柄高的 1.1—1.2 倍。



体较高，稍侧扁，背、腹缘隆起。吻圆钝，宽度大于长，吻端具 2—3 横列不很整齐但十分显著的珠星。口下位，呈弧形。吻皮下垂，与上唇分离，盖住上唇中部，边缘具细缺刻；上唇紧贴上颌表面，其边缘有一列肉质小乳突，侧端有横纹且分裂成多数小乳突，尤以大个体更为显著。上下唇在口角处相连。下颌由深沟与下唇分离。唇后沟短，直行向前，具颏沟。眼位于头中部。须 2 对。吻须细弱，口角须较发达，其长稍短于眼径。鳞片中等大，背鳍前鳞片小，排列不整齐，胸部鳞片小，腹鳍基部具腋鳞。侧线平直，径行于尾柄中轴。

背鳍无硬刺，外缘平截或微凹，最长鳍条稍短于或等于头长，其起点位于腹鳍之前 3—4 个鳞片距离的上方。腹鳍起点距尾鳍基较距吻端为近，其末端向后伸稍超过肛门。臀鳍起点距腹鳍基较距尾鳍基为近，其后缘内凹，后伸不达尾鳍基。尾鳍分叉。

固定标本体浅灰黑色，腹部灰白色，体侧绝大部分鳞片有黑色外框。各鳍均呈浅灰色。

分布于云南的元江水系至越南红河。

### 桂华鲮 *Sinilabeo decorus* (Peters), 1880 (图 113)

*Labeo decorus* Peters, 1880, *Monatsber. Akad. Wiss. Berl.*: 1031 (香港).

*Varicorhinus brevis* Lin (林书颜), 1931, 南中国鲤鱼及似鲤鱼类之研究: 108 (广东).

*Osteochilus brevis*: Lin, 1933, *Lingnan Sci. J.*, 12 (3): 342.

*Sinilabeo tungting brevis*: Bănărescu, 1973, *Rev. Roum. Biol. (Zool.)*, 18 (2): 107.

*Sinilabeo decorus decorus*: 伍献文等, 1977, 中国鲤科鱼类志 (下卷): 337 (广西百色、龙州、贵县、融安、柳州、漓江); 潘炯华等, 1981, 华南师院学报 (自然科学版) (2): 10 (广东英德、乐昌、阳山); 陈景星等 (见郑慈英), 1989, 珠江鱼类志: 199 (广东英德; 广西融安、阳朔); 吕克强 (见伍律等), 1989, 贵州鱼类志: 165 (镇宁、关岭、兴义、榕江); 褚新洛等, 1989, 云南鱼类志 (上册): 255 (富宁剥隘); 陈湘舜 (见中国水产科学研究院珠江水产研究所等), 1991, 广东淡水鱼类志: 169 (阳山).

*Sinilabeo decorus*: 方世勋 (见广西壮族自治区水产研究所等), 1981, 广西淡水鱼类志: 88 (阳朔、昭平、三江、融安、融水、宜山等 11 处).

测量标本 28 尾; 体长 76—273mm; 采自广西融安、贵县、阳朔; 广东英德、阳山。

背鳍 iii-11; 臀鳍 iii-5; 胸鳍 i-15—16; 腹鳍 i-8。侧线鳞  $40 \frac{7-9}{6-7-v} 44$ ; 背鳍前鳞

20—24; 围尾柄鳞 24。下咽齿 3 行, 2·4·5—5·4·2。第一鳃弓外侧鳃耙 67—76。脊椎骨 4+36。

体长为体高的 3.1—4.2 倍, 为头长的 4.2—5.0 倍, 为尾柄长的 5.3—6.6 倍, 为尾柄高的 6.3—7.1 倍。头长为吻长的 2.2—2.6 倍, 为眼径的 3.8—5.4 倍, 为眼间距的 2.1—2.6 倍。尾柄长为尾柄高的 1.05—1.2 倍。