

### 元江华鲮 *Sinilabeo xanthogenys* (Pellegrin et Chevey), 1936 (图 114)

*Labeo xanthogenys* Pellegrin et Chevey, 1936, Bull. Soc. Zool. Fr., 61: 221 (红河).

*Sinilabeo decorus xanthogenys* 伍献文等, 1977, 中国鲤科鱼类志 (下卷): 338 (云南河口); 褚新洛等, 1989, 云南鱼类志 (上册): 256 (河口).

测量标本 5 尾; 体长 171—234mm; 采自云南元江、河口。

背鳍 iii-10—11; 臀鳍 iii-5; 胸鳍 i-17—18; 腹鳍 i-8。侧线鳞  $42 \frac{7.5-8}{6.5-7-v} 43$ ; 背鳍前鳞 23—24; 围尾柄鳞 24。下咽齿 3 行, 2·4·5—5·4·2。第一鳃弓外侧鳃耙 49—52。脊椎骨数 4+36。




图 114 元江华鲮 *Sinilabeo xanthogenys* (Pellegrin et Chevey)

体长为体高的 2.7—3.1 倍, 为头长的 4.2—4.9 倍, 为尾柄长的 5.8—6.2 倍, 为尾柄高的 5.8—6.2 倍。头长为吻长的 2.2—2.3 倍, 为眼径的 5.0—5.8 倍, 为眼间距的 2.0—2.2 倍。尾柄长为尾柄高的 0.9—1.0 倍。

体高, 尾柄高而短, 尾柄长与高约相等。吻长与吻宽相等或稍宽, 雄鱼吻端具有微小而密集的珠星。吻皮下垂, 覆盖上唇的中部, 上唇两侧外露, 其边缘具横向沟纹。上唇紧贴上颌, 于口角处与下唇相连。口下位, 呈弧形。下唇与下颌有沟相隔, 下唇内面及边缘布满小乳突, 下颌有薄锋。唇后沟深, 仅位口角, 颊沟较浅。须 2 对, 吻须短小, 其长不及口角须长之半。眼中等大, 侧上位; 眼间宽。鳞片中等大, 胸部鳞显著小, 背鳍前鳞不规则, 且小。腹鳍基部有狭长的腋鳞, 背、臀鳍基部均具鳞鞘。侧线平

直。

背鳍外缘深内凹，最长鳍条远比头长，约为头长的1.4—1.6倍。胸鳍长约等于头长。腹鳍起点约在背鳍起点后3—4个侧线鳞的下方，其末端后伸超过肛门，近达臀鳍。肛门紧靠臀鳍。臀鳍外缘内凹，其末端后伸不达尾鳍基，但很接近。尾鳍分叉，上下叶等长，末端尖。

下咽齿侧扁，齿面平，顶端斜截。鳃耙尖形，呈片状，排列紧密。鳔2室。肠长。腹膜棕红色，布有零散小黑点。

固定标本全体黑灰，腹部色较淡，每鳞的基部有新月形黑色斑点。各鳍微黑色。

分布于云南元江水系直至越南红河。

### 洞庭华鲮 *Sinilabeo tungting* (Nichols), 1925 (图115)

*Varicorhinus tungting* Nichols, 1925, Am. Mus. Novit., (182): 3 (洞庭湖).

*Labeo diplostomus*: 梁启燊、刘素丽(不是 Heckel), 1966, 湖南师范学院学报: 88 (湘江、澧水).

*Sinilabeo tungting*: Bănărescu, 1973, Rev. Roum. Biol. Ser. Zool., 18 (2): 105 (部分); 丁瑞华, 1994, 四川鱼类志: 348 (酉阳).

*Sinilabeo decorus tungting*: 伍献文等, 1977, 中国鲤科鱼类志(下卷): 338 (洞庭湖; 湖北洪湖); 湖南省水产科学研究所, 1980, 湖南鱼类志(修订版): 103 (沅水、洞庭湖); 吕克强(见伍律等), 1989, 贵州鱼类志: 166 (锦屏、剑河).

测量标本11尾; 体长78—213mm; 采自湖南岳阳、澧水, 湖北洪湖, 四川酉阳等地。

背鳍iii-10—11; 臀鳍iii-5; 胸鳍i-16—18; 腹鳍i-8。侧线鳞 $42\frac{7-8}{6-v}44$ ; 背鳍前鳞15—18; 围尾柄鳞20。下咽齿3行,  $2 \cdot 4 \cdot 5 - 5 \cdot 4 \cdot 2$ 。第一鳃弓外侧鳃耙约48。脊椎骨数 $4 + 36 - 37$ 。

体长为体高的3.7—4.4倍, 为头长的4.3—4.9倍, 为尾柄长的5.3—6.8倍, 为尾柄高的6.1—7.1倍。头长为吻长的2.1—2.7倍, 为眼径的4.5—6.4倍, 为眼间距的1.8—2.2倍。尾柄长为尾柄高的1.0—1.1倍。

体长, 稍侧扁, 尾柄粗短。吻圆钝, 吻长约与眼后头长相等, 吻端有2—3列稀疏排列不整齐的大珠星, 吻侧有一斜沟从吻端走向口角。吻皮下垂盖住上唇中段, 两侧端外露。上唇与上颌不分离, 紧贴在上颌外表, 其外缘的两侧具横纹, 中段光滑, 在口角处直接与下唇相连。口下位, 呈弧形, 口角距稍小于眼间距。下唇有沟与下颌分离。下唇的前缘和内缘具肉质小乳突。唇后沟短, 在颏部中断, 无皮褶形成的浅沟。颏沟显著。须2对, 吻须稍细, 短于口角须, 体长100mm以内的幼鱼, 其吻须尚存在, 成鱼吻须消失。峡部间距小于吻长。鳞片中等大, 胸部鳞片小, 埋于皮内。腹鳍基部具一狭