

平展，具发达的肉质鳍柄。胸鳍基长稍大于头长，起点稍前于眼中部的垂直下方，最长鳍条接近吻长而稍短于最长背鳍条长，末端超过腹鳍起点。腹鳍起点显著在背鳍起点之前，约在吻端至肛门间的中点，左右腹鳍条在后缘中部完全愈合成吸盘状，后缘无缺刻，末端远不达肛门。肛门接近臀鳍起点。尾鳍长约为头长相等，末端凹形，下叶稍长。

固定标本体背侧黑褐色，腹面浅灰色，横跨背中线有 7—9 个暗黑色斑块。奇鳍均具由黑色斑点组成的条纹，其中臀鳍 1 条，背鳍和尾鳍 3 条，偶鳍的背侧面散布有浅灰色斑纹。

分布于长江上游及其支流清江。

南盘江华吸鳅 *Sinogastromyzon nanpanjiangensis* Li, 1987 (图 337)

Sinogastromyzon nanpanjiangensis Li (李维贤), 1987, 动物分类学报, 12 (1): 101 (云南路南); 陈银瑞 (见褚新洛等), 1990, 云南鱼类志 (下册): 98 (路南、宜良)。

测量模式标本 2 尾; 体长 47—51mm; 采自云南路南。

背鳍 iii-8; 臀 ii-5; 胸鳍 xiv-13—15; 腹鳍 ix-12—13。侧线鳞 67—73。




图 337 南盘江华吸鳅 *Sinogastromyzon nanpanjiangensis* Li

体长为体高的 5.7—7.9 倍，为体宽的 3.0—3.6 倍，为头长的 4.2—4.7 倍，为尾柄长的 6.4—6.7 倍，为尾柄高的 11.3—13.6 倍，为背鳍前距的 2.1—2.2 倍，为腹鳍前距的 2.3—2.4 倍。头长为头高的 1.9—2.0 倍，为头宽的 0.7—0.9 倍，为吻长的 1.5—1.7 倍，为眼径的 5.0—6.0 倍，为眼间距的 2.0—2.2 倍。尾柄长为尾柄高的 1.8—2.0 倍。

头宽为口宽的 1.9—2.0 倍。

体较短，前段宽，甚平扁，后段渐显侧扁，背缘呈弓形隆起，腹面平坦。头很低平。吻端圆钝，边缘很薄；吻长约为眼后头长的 2 倍。口裂很宽，下位，呈弧形。唇较薄，上唇具 9—11 个明显的乳突，排成 1 排；下唇乳突不显著；颊部中央具 1 对不甚明显的纵脊状乳突。上下唇在口角处相连。下颌前缘稍外露，表面具放射状的沟和脊。上唇与吻端之间具较深的吻沟，延伸到口角。吻沟前的吻褶分 3 叶，叶端圆钝，中叶较大。吻褶叶间具 2 对小吻须，外侧 1 对略粗大，约为眼径的 1/4。口角须 2 对，均小于外侧吻须。鼻孔较大，具发达的鼻瓣。眼中等大，侧上位。眼间宽阔，平坦。鳃裂稍扩展到头部腹面。鳞细小，偶鳍基部的背侧面和胸鳍腋部至腹鳍起点间的体侧均被鳞片，仅在头背及腹鳍基部之前的腹面无鳞。侧线完全，自体侧中部平直地延伸到尾鳍基部。

背鳍基长与吻长相等，起点约在吻端至尾鳍基部的中点稍前，臀鳍基长不足背鳍基长的一半，前缘不分枝鳍条的基部扩大变硬，仅末端的约 1/4 柔软，压倒后末端接近或达到尾鳍基部。偶鳍宽大平展，具发达的肉质鳍柄，鳍条较短。胸鳍基长约为头长的 1.5 倍，起点在鼻孔后缘的垂直下方，最长鳍条不及吻长，末端超过腹鳍起点。腹鳍起点显著在背鳍起点之前，约在吻端至臀鳍起点间的中点，左右腹鳍条在后缘中部完全愈合合成吸盘状，后缘无缺刻，末端接近或稍超过臀鳍起点。肛门在腹鳍腋部至臀鳍起点间的中点或稍后。尾鳍长约等于头长，末端深凹，下叶稍长。

固定标本体背侧棕褐色，腹面浅灰黄色，横跨背中线有 7—9 个暗褐色圆斑。奇鳍均具由不甚显著的黑色斑点组成的条纹，偶鳍的背侧面基部褐色，边缘淡黄色。

分布于南盘江水系。

伍氏华吸鳅 *Sinogastromyzon wui* Fang, 1930 (图 338)

Sinogastromyzon wui Fang (方炳文), 1930, *Sinensia*, **1** (3): 36 (广西罗城); Fang (方炳文), 1931, *Sinensia*, **2** (1): 53 (广西罗城、龙州); Hora, 1932, *Mem. Indian Mus.*, **12**: 303; Silas, 1952, *Rec. Indian Mus.*, **50**: 217; 陈宜瑜, 1978, 水生生物学集刊, **6** (3): 344 (广西融安、桂林、阳朔; 广东英德); 郑慈英、陈宜瑜, 1980, 动物分类学报, **5** (1): 89 (广东); 岳佐和 (见广西壮族自治区水产研究所等), 1981, 广西淡水鱼类志: 165 (桂林、阳朔、三江等); 郑慈英, 1981, 暨南大学学报 (自然科学版), (1): 57 (珠江); 郑慈英等, 1982, 动物学研究, **3** (4): 394 (南盘江); 郑慈英、张卫, 1987, 暨南理医学报, (3): 80 (珠江的都柳江、南、北盘江); 郑建州 (见伍律等), 1987, 贵州鱼类志: 214 (榕江、从江); Kottelat and Chu (褚新洛), 1988, *Rev. suisse. Zool.*, **95** (1): 197; 陈宜瑜、郑慈英 (见郑慈英等), 1989, 珠江鱼类志: 269 (广东英德; 广西桂林); 陈银瑞 (见褚新洛等), 1990, 云南鱼类志 (下册): 97 (广南、富宁); 郑慈英 (见中国水产科学研究院珠江水产研究所等), 1991, 广东淡水鱼类志: 259 (英德)。

Sinogastromyzon intermedius Fang (方炳文), 1931, *Sinensia*, **2** (1): 54 (广西龙州); Silas, 1952,