

分布 仅见于中国台湾的澎湖。国外分布于爪哇海至马鲁古海的太平洋西部海域。

(46) 江口小公鱼 *Stolephorus commersonii* Lacépède, 1803 (图 II-58)

Stolephorus commersonii Lacépède, 1803. Hist. Nat. Poiss., 5: 382, pl. 12, fig. 1; Bleeker, 1873. Neder. Tijdschr. Dierk, 4: 148 (厦门); 丘书院, 1984. 福建鱼类志 (上): 143—144, 图 92 (福鼎沙埕、平潭东庠、厦门集美、龙海石码、东山及九龙江口); 陈兼善, 1985. 台湾脊椎动物志 (上): 275, 图 6-72 (高雄、东港).

Stolephorus browni Bleeker, 1865. Neder. Tijdschr. Dierk: 57 (厦门).

Stolephorus commersoniamus Bleeker, 1872. Atlas Ichthyol.: 128 (厦门).

Engraulis commersonii Fowler, 1929. Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 81: 600 (香港).

Engraulis commersonianus Wu (伍献文), 1929. Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, 5 (4): 21—22 (厦门).

Scutengraulis commersonii Wang (王以康), 1935. Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, 11 (1); 4 (炎宁); Fowler, 1931. Hong Kong Nat., 2 (1—3): 200—201 (香港、厦门); 张春霖, 1955. 黄渤海鱼类调查报告: 55, 图 38 (山东青岛、石臼所).

Anchoviella commersonii Fowler, 1941. Bull. U. S. natn. Mus., 13 (100): 703—706 (中国); 王以康, 1958. 鱼类分类学: 90 (中国); 王文滨, 1962. 南海鱼类志: 127, 图 98 (南澳、三亚、闸坡、干冲); 王文滨, 1963. 东海鱼类志, 107, 图 81 (石塘).

英文名 Esturied anchovy (FS)、Commerson's anchovy (FAO)。




图 II-58 江口小公鱼 *Stolephorus commersonii* (仿王文滨, 1962)

别名 康氏梭鲷 (张春霖, 1955)、康氏银带鲷 (王以康, 1958)、孔氏银带鲷 (陈兼善, 1985)、康氏小公鱼 (王文滨, 1962)、江鱼 (闽南通称)、黄巾 (平潭)、白弓 (连江、长乐、福鼎)、公鱼 (南澳、三亚)。

形态

测量标本 20 尾, 采自浙江石塘, 广东南澳、闸坡、海南三亚、干冲。体长 47—72mm。

背鳍 15—16; 臀鳍 19—22; 胸鳍 12—13; 腹鳍 7。纵列鳞 37—39; 横列鳞 8—9。

体长为体高的 4.5—5.1 倍，为头长的 4.0—4.4 倍。头长为吻长的 4.25—5.4 倍，为眼径的 3.33—4.25 倍，为眼间隔的 4.7—5.6 倍。

体长形，略侧扁。头较小。吻稍突出。眼前上位，眼径等于或大于吻长。眼间隔隆起。鼻孔位于吻端和眼前缘之间。口大，下位。上下颌、犁骨和腭骨有细齿。鳃盖骨光滑。鳃孔大。假鳃发达。鳃耙细长，16—19+20—25。鳃盖膜彼此略相连而不与峡部相连。鳃盖条 11—13。

体被圆鳞，易脱落。鳞片上的 7 条横沟线近于平行，环心线细。无侧线。腹鳍前方的腹缘上有 6—7 个骨刺。

背鳍位于吻端和尾鳍末端的中间，尾鳍基底较距吻端略近。臀鳍始于背鳍基底中央的下方，其基部长于背鳍基。胸鳍长约等于眼后头长，其基部有腋鳞。腹鳍长大于眼径。尾鳍叉形。

体白色，沿体侧有一条银白色纵带。头背面有“凹”状绿斑，自背鳍向后沿背缘有 2 行小绿点。臀鳍基部也有绿色小点。各鳍白色，仅尾鳍后缘呈淡绿色。

习性 为中上层小型鱼类，通常体长 60mm 左右，长者达 125mm (Weber *et* Beaufort, 1913)。栖息近海一带。以浮游挠足类和毛虾等为食。不喜强光。有昼夜垂直移动现象。在福建沿海每年 4—5 月，鱼群由近海进入九龙江口海面产卵。产卵期 4—8 月，以 4 月底至 6 月中为盛期。仔鱼在近海长大，至 10 月底水温下降，离开九龙江口到南部海区越冬。

产量大，福建沿海年产量约为 500—1000t，加工成干制品销售。

分布 北起山东青岛，南至海南三亚。国外分布西起东印度洋，东至菲律宾，北起朝鲜，南至印度尼西亚的印度-西太平洋海域。

(47) 棘背小公鱼 *Stolephorus tri* (Bleeker, 1852) (图 II-59)

Engraulis tri Bleeker, 1852. *Verh. Batav. Genootsch.* (Haringacht), 24: 40 (巴达维亚).

Stolephorus tri Bleeker, 1865. *Neder. Tijdschr. Dierk.*: 57 (厦门); Bleeker, 1872. *Atlas Ichthyol.*: 262 (厦门); Fischer *et* Whitehead, 1974. *FAO species identification sheets for fishery purposes*: 30 (南中国海); 陈兼善, 1985. *台湾脊椎动物志* (上), 275 (淡水、东港).

Scutengraulis tri Fowler, 1931. *Hong Kong Nat.*, 2 (3): 201, fig. 17 (厦门).

Anchoviella tri Fowler, 1941, *Bull. U. S. natn. Mus.*, 13 (100): 709—710 (厦门); 王文滨, 1962. *南海鱼类志*: 128, 图 99 (北海).

英文名 Spined anchovy (FS)、Spined anchovy (FAO)。

别名 印尼小公鱼 (王文滨, 1962)、居里银带鲱 (陈兼善, 1985)、公鱼 (广西北海)。

形态

测量标本 1 尾，采自广西北海。体长 56mm。