

棘短，有细粒状棘突。尾鳍截形。

头体背侧灰褐色，腹部白色。上唇后方有 1 灰蓝色横带围绕上唇。眼间隔灰蓝色，有 3 条灰黑色横纹。眼下经鳃孔到肛门及臀鳍前部有 1 条黑棕色宽斜带。眼下至鳃孔的宽带前方尚有 1 条褐色细条纹，自眼前方伸到胸鳍基底前方。尾柄中部有 1 向前的楔形黑棕色斑，其前有 2 条“<”形黄色斑纹，正对着楔形黑斑的外方。第一背鳍灰黄色，第二背鳍及臀鳍淡灰黄色。胸鳍灰色，基部黑色，外方有 1 红色横纹。尾鳍深灰色。

斜带锉鳞鲀为暖水性鱼类，在热带珊瑚丛较常见，体长可达 218mm。

中国产于西沙群岛海域和台湾沿海。国外分布于红海、印度洋非洲东海岸至太平洋中部夏威夷群岛等热带海区。

### 大斑锉鳞鲀 *Rhinecanthus verrucosus* (Linnaeus, 1758) (图 28)

*Balistes verrucosus* Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 328 (Indian); Bloch et Schneider, 1801, Syst. Ichth., 465; Günther, 1870, Cat. Fish. Brit. Mus., vol. 8, 225; Seale, 1908, Proc. U. S. Nat. Mus., 33: 248 (Philippines); de Beaufort, 1962, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. 11, 801.

*Balistes (Balistapus) verrucosus*: Bleeker, 1865, Atlas Ichth., 5: 120, pl. 216, fig. 2.

*Balistes cinereus* Günther, 1870, Cat. Fish. Brit. Mus., vol. 8, 226 (Mauritius).

*Balistes verrucosus*: Kner, 1865~1867, Novara-Exped. Fische, 1: 339; Jordan et Seale, 1906, Bull. Bur. Fish., 25: 363 (Samoa); Herre, 1924, Philipp. Jour. Sci., 25 (4): 443 (Philippines); Liang et Yeh, 1964, Fish. Mus. Dept. Zool. Natn. Taiwan Univ., : 60 (Keelung); Chen, 1969, Syn. Vert. Taiwan, 1: 232 (Shiao Liu Chiu).

*Rhinecanthus verrucosus*: Munro, 1967, Fish. New Guinea, 564, pl. 75, fig. 1055; Chang et Lee, 1968, Yearbook Taiwan Mus., 11: 70 (Heng-chau); Shen et Lin, 1974, Acta Oceanogr. Taiwanica, 4: 208~210, fig. 12 (Taiwan); Matsuura, 1980, Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. A (Zool.), 6 (1): 58~59, fig. 21 (Japan); Masuda et al., 1984, Fish. Jap. Archip., 359, pl. 323-G.

毒吻棘鲀 *Rhinecanthus verrucosus*: 沈世杰, 1993, 台湾鱼类志, 591, 图版 201-1 (台湾)。

背鳍 III, 2+21~24; 臀鳍 2+19~21; 胸鳍 1+12~13; 尾鳍 1+10+1。体侧鳞 34~37 横行。

体长为体高 1.9~2.2 倍，为头长 2.4~2.7 倍。头长为吻长 1.4~1.5 倍，为眼径 4.3~5.4 倍。

体长椭圆形，侧扁而高，背缘圆弧形。尾柄短，侧扁，尾柄长为尾柄高 1.0~1.2 倍。头长大，背缘在眼前方稍凹入。吻较长，眼前方无纵凹沟。鼻孔小，每侧 2 个，位于眼前方。口小，前位。上下颌均有具凹刻的楔状齿。唇肥厚。鳃孔短，几垂直或稍倾斜，下端与眼的后缘相对。脊椎骨 7+11=18。

鳞中等大，多为菱形，除上下唇外全体被鳞。鳃孔后方有数枚骨板状大鳞。尾部有 3 行向前倒的黑色钩状棘，下方 2 行明显长于上方 1 行，每行有 9~10 棘。



背鳍 2 个，第一背鳍起点在鳃孔上方，具 3 鳍棘，第一鳍棘粗大，棘上有 2 行粒状突起，吻长为其长 1.4~1.6 倍；第二鳍棘细尖，第三鳍棘极短，纳于背缘鳍沟内。第二背鳍始于肛门上方。臀鳍与第二背鳍相似，外缘圆弧形。胸鳍短圆形，侧位。腹鳍棘短，能活动，棘上有一些小棘突。尾鳍截形。




图 28 大斑锉鳞鲀 *Rhinecanthus verrucosus* (Linnaeus) (依 Matsuura, 1980)

体深褐色，腹部色浅。自眼下方至胸鳍基底有 1 黑色宽带，宽带的两边及中央有蓝色线纹。眼间隔褐色，边缘有蓝色线纹。口角浅蓝色，自下唇至胸鳍基底下缘有一红色线纹。体腹侧有 1 大形黑斑。尾柄部有 1 黑色横带。第一背鳍褐色，第二背鳍、臀鳍及胸鳍灰黄色。尾鳍黄褐色。

大斑锉鳞鲀为暖水性鱼类，在热带珊瑚丛中较常见，体长可达 180mm。

中国现知产于台湾沿海。国外广泛分布于印度—西太平洋海域。

### 多棘鳞鲀属 *Sufflamen* Jordan, 1916

*Sufflamen* Jordan, 1916, *Copeia*, 1916 (29): 27.

Typa-species: *Balistes capistratus* Shaw, 1804 = *Balistes fraenatus* Latreille, 1804.

*Hemibalistes* Fraser-Brunner, 1935, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (10) 15: 662.

Type-species: *Balistes bursa* Bloch et Schneider, 1801.

体长椭圆形，侧扁而高，背缘圆突。尾柄短，侧扁。头较长大。吻长大，眼前方、鼻孔下方有一纵凹沟。眼小，侧位而高。口小，前位。上下颌齿白色，齿边缘有凹刻。