

洋马歇尔群岛、马利亚那群岛，北至日本，南至菲律宾等。

黄鳍多棘鳞鲀 *Sufflamen chrysopterus* (Bloch et Schneider, 1801) (图 30)

Balistes chrysopterus Bloch et Schneider, 1801, Syst. Ichth., 466 (Indian); Jordan et Seale, 1906, Bull. Bur. Fish., 25: 362 (Riukiu Islands); Herre, 1924, Philipp. Jour. Sci., 25 (4): 429 (Philippines); Fowler, 1928, Mem. B. P. Bishop Mus., 10: 550 (Fate, Jaluit, Tahiti); de Beaufort, 1962, Fish. Indo-Austr. Archip., vol. 11, 292; Chen, 1969, Syn. Vert. Taiwan, 1: 231.

Balistes albocaudatus Richardson, 1845, Rept. Brit. Assoc. Adv. Sci., 15: 201 (China); Whitehead, 1969, Bull. Brit. Nat. Hist., 3 (7): 218 (China).

Balistes niger Günther, 1870, Cat. Fish. Brit. Mus., vol. 8, 218.

Hemibalistes chrysopterus: Munro, 1955, Mar. Fre. Wat. Fish. Ceylon, 271, pl. 53, fig. 790 (Ceylon); Shen et Lin, 1974, Acta Oceanogr. Taiwanica, 4: 217~219, figs. 18, 19 (Taiwan).

Sufflamen chrysoptera: Randall, 1955, Atoll Res. Bull., (47): 219, 223; Jones et al., 1972, Inst. Oceanogr. Natn. Taiwan Univ., Spec. Publ., 1: 91 (Heng-chun).

Sufflamen chrysopterus: Matsuura, 1980, Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. A (Zool.), 6 (1): 50~51, fig. 16 (Japan); Masuda et al., 1984, Fish. Jap. Archip., 358, pl. 322-A, B (Japan); Smith et Heemstra, 1986, Smiths' sea fishes, 881, pl. 139, 140.

黄鳍鳞鲀 *Balistes chrysopterus*: 苏锦祥, 1979, 南海诸岛海域鱼类志 (南海水产研究所等主编), 539, 图版 32, 图 112 (西沙).

金鳍鼓气鳞鲀 *Sufflamen chrysopterus*: 沈世杰, 1993, 台湾鱼类志, 592, 图版 201-3、4 (台湾).




图 30 黄鳍多棘鳞鲀 *Sufflamen chrysopterus* (Bloch et Schneider) (依 Matsuura, 1980)

测量标本 10 尾，体长 101.3~187mm，采自海南陵水、新村，西沙群岛永兴岛、

永乐岛、石岛和七连岛。

背鳍Ⅲ，2+24~26；臀鳍2+21~23；胸鳍1+12；尾鳍1+10+1。体侧鳞42~46横行。

体长为体高1.7~2.1倍，为头长2.7~3.0倍。头长为吻长1.3~1.6倍，为眼径5.0~7.5倍。

体长椭圆形，侧扁，背缘隆起。尾柄短，侧扁，尾柄长为尾柄高1.2~1.5倍。头长大，在眼前方、鼻孔下方有纵凹沟。眼较小，侧位而高，眼间隔宽平，眼间隔宽为眼径1.4~2.1倍。鼻孔小，每侧2个，位于眼前方。口小，前位。上下颌齿每侧4枚，楔状。唇肥厚。鳃孔侧位，稍倾斜，下端与眼的后缘相对。脊椎骨7+11=18。

鳞较小，多为菱形，头体除上下唇外均被鳞，鳃孔后方有一丛数枚骨板状大鳞。尾部鳞片上有7~8行小棘，中间一行棘数最多，有18枚左右，尾部小棘向前延伸超过第二背鳍基底的1/2。

背鳍2个，第一背鳍起点在鳃孔稍后方，具3鳍棘，第一鳍棘粗大，前缘粗糙，有许多粒突，头长为第一鳍棘长1.9~2.1倍；第二鳍棘细弱，第三鳍棘更短，埋于背缘鳍沟内。第二背鳍始于肛门上方。臀鳍与第二背鳍相似，起点约在第二背鳍第五鳍条下方。胸鳍短圆，低侧中位。腹鳍棘短，上有粒状突起，略能活动。尾鳍截形。

体棕褐色，腹部蓝紫色，头部背侧蓝褐色。第一背鳍灰褐色，第二背鳍、臀鳍及胸鳍棕红色。尾鳍黑褐色，上下缘有灰白色线纹，尾鳍后缘乳白色，呈新月形。幼鱼体色分上下两半，背侧黄褐色，腹侧白色。

黄鳍多棘鳞鲀为暖水性鱼类，喜栖息在1~30 m深的较浅的海域，喜独居，在珊瑚丛中常可发现，以底栖无脊椎动物为食，遇惊躲入礁洞。体长可达170 mm。

中国产于海南岛、西沙群岛海域及台湾沿海。国外分布于红海、印度洋非洲东海岸至太平洋中部密克罗尼西亚。

缙纹多棘鳞鲀 *Sufflamen fraenatus* (Latreille, 1804) (图 31)

Balistes fraenatus Latreille, 1804, *Nouv. Dict. Hist. Nat.*, ed. 1, 24 (Poissons), 74; de Beaufort, 1962, *Fish. Indo-Austr. Archip.*, vol. 11, 290.

Balistes capistratus Shaw, 1804, *Gen. Zool.*, 5: 417; Jordan *et* Seale, 1906, *Bull. Bur. Fish.*, 25: 362 (Samoa); Herre, 1924, *Philipp. Jour. Sci.*, 25 (4): 43; Fowler, 1928, *Mem. B. P. Bishop Mus.*, 10: 450 (Oceania); Chang *et* Lee, 1968, *Yearbook Taiwan Mus.*, 11: 69 (Heng-chun).

Balistes mitis Bennett, 1831, *Proc. Zool. Soc. London*, 1: 169 (Mauritius); Günther, 1870, *Cat. Fish. Brit. Mus.*, vol. 8, 290.

Balistes hihpe Richardson, 1845, *Rept. Brit. Assoc. Adv. Sci.*, 15: 200 (China); Whitehead, 1969, *Bull. Brit. Mus. Hist.*, 3 (7): 218 (China).

Balistes frenatus: Richardson, 1845, *Rept. Brit. Assoc. Adv. Sci.*, 15: 201 (China); Whitehead, 1969,