

分布于西太平洋中部；中国有 1 种。

(105) 拟翔鲈 *Cottapistus cottoides* (Linnaeus, 1754) (图 209)

Perca cottoides Linnaeus.1754: *Mus. Adolphi Friederici*, 2 :84.

Apistus cottoides Cuvier et Valenciennes.1829: *Hist.Nat.Poiss.*4: 410; Richardson.1846: *Voy. Samarang*.

Prosopodasys cottoides Gunther.1860: *Cat.Fish Brit.Mus.*,(2): 142; Bleeker.1872: (4~7).

Cottapistus cottoides Bleeker. (1873)1876: *Verh. Akad. Amsterdam. Mem. Scorpenoides*,: 75, *Ichth.* IX; 1879, Tab. CCCCXV, fig.7; Beaufort et Briggs.1962: *Fish.Indo-Austr.Arch.*,11: 84.

依 Beaufort et Briggs (1962) 改写。

背鳍 XIV-6~7；臀鳍 III-7；胸鳍 13~14；腹鳍 I-4；尾鳍 12。侧线黏液孔 20。

体长为体高 3.1 倍；为头长 2.7 倍；为腹鳍起点至臀鳍 3.9 倍。头长为吻长 5.8 倍；为眼径 3.3 倍；为眼后头长 1.9 倍；为上颌长 1.8 倍；为尾柄长 2.1 倍；为尾柄高 2.3 倍；为背鳍第一鳍棘 3.5 倍、第二至第三鳍棘 2.3 倍、第五鳍棘 2.6 倍、第六至第九鳍棘 2.9 倍、第十至第十一鳍棘 3.3 倍、第十二至第十四鳍棘 3.8 倍、最长鳍条 2.6 倍；为臀鳍第一鳍棘 5.8 倍、第二鳍棘 3.8 倍、第三鳍棘 2.7 倍、最长鳍条 2.6 倍；为胸鳍长 1.3 倍、基底宽 3.3 倍；为腹鳍长 3.5 倍、鳍棘 4 倍；为尾鳍长 1.5 倍。颜角前段 57 度，后段 33 度。

体中长，甚侧扁，长椭圆形，背缘浅斜弧形，腹缘浅凹弧形，尾部向后渐狭小；躯干前半部稍高，腹鳍基部处体最高，躯干长短于尾长，为尾长 $3/5$ ；尾柄中长，尾柄长约为尾柄高 1.1 倍。头颅大，甚侧扁，背缘圆弧形，腹缘平斜。吻颇短，圆钝，吻长为眼径 $3/5$ 。鼻孔 2 个，靠近；前鼻孔距眼近于距吻端；后鼻孔位于眼稍前。眼大，圆形，上侧位，眼球上部靠近头背缘，至吻端的距离约为眼后头长 0.3 倍。眼间隔狭而平。口大，下端位。口裂前端位于头下侧 $1/3$ 水平线处，口裂长为头长 $1/2$ ，呈 15 度斜裂。上颌略长于下颌，前端凹入；上颌骨伸达眼后下方，后端宽截。下颌前端无明显向下骨突。唇薄。上下颌及犁骨具细牙，腭骨无牙，犁骨牙群左右相连。舌厚，前端尖薄，游离。鳃孔宽大，第四鳃弓后无裂孔。鳃盖骨不与峡部相连。鳃盖条 6。鳃耙粗短。假鳃发达。

无鼻棘。眼前吻侧具 1 眶前骨，眼下方具第一和第二眶下骨，眼后方具第四眶下骨，无第三和第五眶下骨。眶前骨颇大，具 2 棘，后棘长，略短于眼径。第一眶下骨狭长；第二眶下骨伸达前鳃盖骨前缘，眶下棱无棘；第四眶下骨短小，下端连于第二眶下骨。眶前骨具 5 辐射状感觉管，后枝经第一眶下骨伸达第二眶下骨，向上穿过第四眶下骨。前鳃盖骨具 3~5 棘，辐射状排列，无副棘；第一和第二棘较长大；其余各棘向下，渐短小；第五棘微小。鳃盖骨具 2 叉向棘。下鳃盖骨和间鳃盖骨无棘。颅骨棘棱不明显。侧

筛骨光滑，无眼前棘。额骨光滑，眶上棱不明显，无眼上棘和眼后棘；无鼓棘；眼间无明显额棱，无额棘。顶骨光滑，顶棱不明显，无顶棘。眼后至侧线前端的蝶耳棘、翼耳棘、后颞颥棘和肩胛棘均不明显。无肱棘。头部无明显凹洼。前鼻孔和后鼻孔均具皮瓣，头体其他部位无皮瓣。

鳞微小，圆鳞，平铺埋于皮下，不呈覆瓦状排列。头部、喉部和体背前部无鳞；各鳍一般无鳞。侧线平斜，上侧位，后部平直，行于尾柄中央，伸达尾鳍基底。

背鳍起点位于眼前部上方，鳍棘部长，鳍条部短小，鳍棘部长为鳍条部6倍多，其间具1缺刻；鳍条后端几伸达尾鳍基底；第二和第三以及第四鳍棘基部间距较宽大，第一和第二鳍棘基部紧靠；第一鳍棘较短，约等于眼径，与最后鳍棘约等长；第二和第三鳍棘最长，约为第一鳍棘1.6倍；第五至第九鳍棘略长于或等于眼径；后部鳍棘略短小；最后鳍条鳍膜连于尾柄。臀鳍起点位于背鳍倒数第五鳍棘下方，鳍长略短于背鳍鳍条部2倍；鳍条后端不伸达尾鳍基底；第一鳍棘较短，略长于眼径1/2；第二鳍棘较长，略短于眼径；第三鳍棘最长，略长于眼径，略短于最长鳍条；最后鳍条鳍膜连于尾柄。胸鳍稍长大，约等于眼后头长，伸达臀鳍起点上方，具1不分枝、4~5不分枝、8分枝鳍条。腹鳍胸位，具1鳍棘、4鳍条，不伸达臀鳍；鳍棘长约为第一鳍条1/2，最后鳍条鳍膜连于体壁。尾鳍后缘圆截形，短于胸鳍，长于腹鳍。

体腔大，腹膜白色。胃大，椭圆形。肠较粗短，盘曲2次。肝2叶。幽门盲囊短小。

体褐红色，头、体和鳍上散布不规则斑纹、斑点、圈纹和条纹，尾鳍具狭细横纹。圈纹为白色、边缘黑色，头侧尤为明显。

暖水性海洋鱼类，小型，体长约为80余mm。近海底层栖息，摄食海底无脊椎动物和小鱼等。卵生。数量少，偶为拖网所兼捕，无经济价值。为一刺毒鱼类。

分布于西太平洋中部，印度尼西亚、马来半岛、菲律宾和中国南部海域。




图 209 拟翔鲉 *Cottapistus cottoides* (Linnaeus)
(仿 Beaufort, 1962)(体长 68mm)