

纹,腹以下转为棕褐,黑纹渐微,但散有明显的三角状白点,尾下覆羽渲染棕色。

雌雄羽色相同。

虹膜深褐;嘴黑;脚肉褐色。

量衡度<sup>1)</sup>:

性别	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♀	♀ 130	12	72—77	45—47	30 (据 Baker)
♀(1)	♀ 130	11	72	42	28

**亚种分化** 本种除指名亚种外,还有一个亚种 (*B. s. fusca*) 见于越南北部。

**生态** 此鸟非常罕见。据 Ali 等(1983),它经常出没于杉林间的杜鹃花盛开处和竹丛中,或在山坡上的矮小的杜鹃灌木间;也见于高山带灌木丛以外的岩石和巨砾的裂隙间,无疑是在这里繁殖的(Ludlow)。夏时曾见于海拔3660米的山地(Flemming)。冬时迁到满生苔藓、蕨类的潮湿暗荫的溪边活动。食物包括小型甲虫、蛴螬及昆虫的幼虫,也兼有些植物种子及沙砾等。

*Brachyperyx (Drymochares) Stellatus* Gould, 1868, Proc. Zool. Soc. London: 218 (模式产地:尼泊尔)。

*Heteroxenicus stellatus*, Baker, 1924, 16—17.

*Brachypteryx stellatus*, Vaurie, 1959, 373.

*Brachypteryx stellata*, 郑作新, 1958, 121, Ripley (*in* Mayr *et* Paynter), 1984, 14; Échécopar *et* Hue, 1983, 125; de Schauensee, 1984, 342; Ali *et* Ripley, 1987, 204; 郑作新, 1987, 573.

## 2. 锈腹短翅鸫 *Brachypteryx hyperythra* Jerdon and Blyth

英文名 Rusty-bellied Shortwing.

**地理分布** 仅见于云南贡山冯库,海拔1800—1900米。在国外,分布于印度北部的大吉岭及阿萨姆邦,锡金。

**鉴别特征** 雄鸟上体深蓝,下体大都锈黄色。

**形态** (据昆明动物研究所鸟类组,1980)

雄性成鸟:眼先及眼圈绒黑,具短而宽的白色眉纹,常被额羽掩盖;头侧、头颈两侧以及上体和翼上覆羽呈深蓝色,颊及耳羽黑蓝;两翅褐色,初级飞羽外翮较淡;尾羽黑褐;自颊至上腹及尾下覆羽亮锈黄色,胸和两胁浓暗,喉及腹中央浅淡,呈棕白色。

雌性成鸟:整个上体橄榄褐色;眉纹不显著;眼先及耳羽的轴纹淡色;颊、喉、胸及两胁锈黄,并沾褐色;腹中央及肛周近白;两翅及尾羽褐色,外缘沾棕。

虹膜黑褐色;嘴黑;脚暗褐(雄鸟)或淡褐色(雌鸟)。

据 Ali 等(1983),此鸟下体在雄鸟全为铁锈(ferruginous)色,在雌鸟则较浅淡,腹部中央近白。de Schauensee (1984)却以此鸟下体为赭色(ochraceous),雌淡赭,腹部中央近白。

1) 量度以毫米计,衡度以克计,下同。

量衡度 (据昆明动物研究鸟类组, 1980):

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	15	115	12	64	43	27
♀(1)	15	120	12	64	42	28

**生态** 两脚显然很长, 适于地栖。见于以栎树为主的常绿阔叶林。喜单独在密林下木、灌木丛或竹丛间活动。鸣声悦耳。5月23日采的雄鸟, 睾丸膨大, 约为  $4 \times 7$  毫米 (据昆明动物研究所鸟类组, 1980)。

*Brachypteryx hyperythrus* Jerdon *et* Blyth, 1861, Proc. Zool. Soc. London: 201 (模式产地: 印度 Darjeeling); Ripley (*in* Mayr *et* Paynter), 1964, p. 15; 昆明动物研究所, 1980, p. 145—146; 彭燕章等, 1980, 249—250; de Schauensee, 1984, p. 343; Ali *et* Ripley, 1987, 562; 郑作新, 1987, 573.

*Heteroxenus hyperythrus* Baker, 1924, 17.

### 3. 白喉短翅鹎 *Brachypteryx leucophrys* (Temminck)

英文名 Lesser Shortwing, Brown Shortwing.

**地理分布** 从四川, 云南, 东至福建西北部。在国外, 见于尼泊尔, 不丹, 印度北部, 中南半岛以至印度尼西亚。

**鉴别特征** 颏和喉纯白; 腹部亦白。

**形态** (依据从广西瑶山采得的标本)

雄性成鸟: 上体锈褐色; 无眉纹, 或在眼的上方仅具 1—2 枚白羽; 头与颈的两侧以及两胁, 均与同背同色, 但较浅淡; 颏和喉纯白; 胸羽亦白, 而各缘以浅褐色, 有时这些羽缘还并成一道横带。

虹膜暗褐, 嘴的褐色较深; 脚较浅淡。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	15	115	13.5—14	58—59	40	27—28
♀(1)	—	—	14	61	—	27

**分类讨论** de Schauensee (1984) 认为此鸟有两种色型: 褐色型与蓝色型; 在国内主要为褐色型, 如上所述。在印度, 据 Ali (1983) 则主要为蓝色型。

这一种短翅鹎有 5 个亚种的分化, 其中见于国内的, 仅下列 2 亚种。

#### 亚种检索

- 上体橄榄褐色 ..... 西南亚种 *Brachypteryx l. carolinae* (17)  
 上体锈褐色 ..... 华南亚种 *B. l. nipalensis* (19)

#### (1) 西南亚种 *Brachypteryx leucophrys carolinae* La Touche

见于云南西部盈江雪梨(海拔 1 500 米)西南部双江及东南部, 广西, 湖南[任国荣], 东至福建西北部(留鸟)。

形态见种的记述。