

41. 紫宽嘴鹎 *Cochoa purpurea* Hodgson

别名 紫鹎(鸟类试编)。

英文名 Purple Cochoa.

地理分布 国内见于四川中部峨眉,贵州西部威宁,云南西北部丽江及西南部。国外见于我南疆诸邻国。

鉴别特征 雄鸟通体淡紫色;头顶和尾羽紫蓝色沾灰,脸侧和颈部黑色;飞羽淡紫色,其羽缘及端部黑色;尾羽具黑色端斑;下体均为淡紫色;雌雄羽色不同。

形态

雄性成鸟: 头顶淡紫蓝色略沾灰;眼先、眉纹、耳羽和颈部均为黑色;背部淡棕紫色;两翅覆羽和次级飞羽基部为淡紫色;初级覆羽黑色;第1、第2枚初级飞羽黑色,其他初级飞羽外翮基部淡紫灰色,构成翅上淡色块斑;次级飞羽端部黑色;尾羽淡紫蓝色沾灰,具黑色端斑;下体均为淡紫,略带淡褐色,喉和胸部羽色较暗。

雌鸟(据 Baker, 1924; Ali 等, 1973): 体羽与雄鸟基本相似,但雄鸟淡紫色部分,被淡红褐色所替代;下体淡土褐色,与雄鸟下体淡紫色有别。

虹膜红褐色;嘴、跗蹠及趾等暗褐色近黑。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	85,89	240,265	18,19	135,132	107,101	27,29

紫宽嘴鹎是单型种,至今未见有亚种分化。

生态 据 Baker (1924) 和 Ali 等(1973),此鸟平时活动于潮湿的、常绿的、地下植物生长茂盛的密林或山谷间。性安静、胆怯而易受惊,成对或单独活动;觅食在地上或树枝间;以水果、浆果、昆虫等为食。据彭燕章等(1987),此鸟多见单个活动,栖于常绿阔叶林内,以昆虫为食。

Cochoa purpurea Hodgson, 1836, Journ. As. Soc. Bengal 5: 359 (模式产地: 尼泊尔); Baker, 1924, 2:184—185; Gee, 1948, 213; 郑作新, 1958, 146; Ripley (*in* Mayr *et* Paynter), 1964, 89; Ali *et* Ripley, 1973, 9:16; de Schauensee, 1984, 354; 吴至康等, 1986, 274; 郑作新, 1987, 609—610; 彭燕章等, 1987, 265—266.

42. 绿宽嘴鹎 *Cochoa viridis* Hodgson

别名 绿鹎(鸟类试编)。

英文名 Green Cochoa.

地理分布 国内分布于云南南部西双版纳;偶见于福建厦门(1♀; 12月)。国外见于我南疆诸邻国。

鉴别特征 头顶与尾羽蓝色;脸侧黑色;两肩至尾上覆羽暗绿色;两翅具灰蓝、黑、褐等色相镶的翼斑;尾羽具黑色端斑;下体淡绿色。

形态 (根据采自云南勐崙的标本)

雌性成鸟：头顶至颈部淡钴蓝色；眼先、眼周和眉纹黑色；耳羽暗蓝色；背部、翅上覆羽、腰部及尾上覆羽均为暗绿色；飞羽黑色，各飞羽片中段灰蓝色，大覆羽和2级飞羽淡黄褐色，基部褐色，各飞羽端部暗褐色，形成灰蓝、黑、褐相镶的翼斑；尾羽蓝色较头顶蓝色略暗，羽端黑色；颊部浅褐色；下体绿色略沾微黄，腹部绿色略带蓝色，尾下覆羽绿色沾褐。

据 Baker (1924)、La Touche (1925—30) 和 Ali 等(1973)，雄鸟与雌鸟相似，但雌鸟褐色部分，雄鸟为蓝色替代。

虹膜黑红色、淡褐橙黄色、暗红色或栗褐色等，嘴黑色，跗蹠、趾、爪等肉褐色或角质褐色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	120	269	18	137	107	29

绿宽嘴鹑是单型种，至今未见有亚种分化。

生态 据 Baker (1924)、La Touche (1925—30) 和 Ali 等 (1973)，此鸟习性与 *Cochoa purpurea* 相似。单个或集小群活动于常绿阔叶林内，或出没于小溪边、常绿密林及险峻的地方。觅食于地上或树上；食物以昆虫、浆果为主，兼食一些软体动物。据彭燕章等(1987)，4月间在云南南部西双版纳曾见此鸟单个活动于常绿阔叶林中；胃内含物完全为昆虫碎片。

Cochoa viridis Hodgson, 1836, Journ. As. Soc. Bengal 5: 359 (模式产地：尼泊尔)；Baker, 1924, 2: 185—186；La Touche, 1925—30, 1:127；Gee, 1948, 213；Smythies, 1959, 134；Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 10:89；Ali et Ripley, 1973, 9:18 de Schauensee, 1984, 354；郑作新, 1987, 609—610；彭燕章等 1987, 266.

XII. 石鹑属 *Saxicola* Bechstein, 1802

形态 嘴强壮，嘴基宽，嘴须发达，嘴的长度小于头长的一半；翅尖形，第1枚初级飞羽的长度为第2枚初级飞羽长度的一半或1/3；尾羽全为黑色，或仅其白色羽缘；跗蹠长度适中，一般在30毫米以下。两性羽色不同。

地理分布 本属计有10种，分布我国仅有5种。白喉石鹑 *S. insignis* 在我国为旅鸟，见于内蒙古、青海。白斑黑石鹑 *S. caprata* 为四川、云南的留鸟。黑白林鹑 *S. jerdoni* 留住于云南西部和南部。灰林鹑 *S. ferrea* 分布较广，为甘肃，陕西，安徽，江西，湖北，湖南，福建，广东，广西，四川，贵州，云南，西藏各地的留鸟。黑喉石鹑 *S. torquata*，分布最广，繁殖季节见于我国的北部和西部，迁徙时经我国东部而至南部越冬。石鹑在国外见于欧洲西部和南部，亚洲，非洲及其附近岛屿大科摩罗岛，马达加斯加岛，留尼汪岛等，