

(2) 云南亚种 *Enicurus maculatus guttatus* Gould

见于四川中部峨眉、甘洛,云南西北部、西部腾冲、中部景东,西藏西部迫龙。国外见于印度,尼泊尔,不丹,孟加拉国及缅甸。

形态、量衡度详见前文。

Enicurus guttatus Gould, 1865, Proc. Zool. Soc. London: 664 (模式产地: 锡金、印度 Darjeeling)。

Enicurus maculatus guttatus Baker 1924, 2:58—59; Gee 1926, 159—160; Ali *et* Ripley, 1973, 9: 15—16; 昆明动物研究所, 1980, 156.

(3) 华南亚种 *Enicurus maculatus bacatus* Bangs *et* Phillips

见于福建西部及云南的东南部。国外见于越南北部。据原始文献 (Rothschild, 1921), 本亚种个体较大, 翅长112—115毫米, 背部的白色斑点较大, 白色斑在颈部形成带状。据 La Touche (1925—30), 采自福建的 *omissus* 亚种, 胸黑无斑。

Enicurus guttatus bacatus Bangs *et* Phillips, 1914, Bull. Mus. Comp. Zool. Harv. Coll. 58:292 (模式产地: 云南东南部保姑寨)。

Enicurus maculatus omissus Rothschild, 1921, Nov. Zool. 28:26 (模式产地: 福建); Gee, 1926, 160.

Henicurus maculatus omissus La Touche, 1925—30, 137.

生态 此鸟多成对活动, 栖息于海拔800—2000米间的地带。动作敏捷, 常出没于林区溪边和河流旁。冬季有垂直迁移的习性。

Enicurus maculatus Vigors, 1831, Proc. Zool. Soc. London: 9 (模式产地: 喜马拉雅山脉地区); Baker, 1924, 2:57—59; 郑作新, 1958, 145; Vaurie, 1959, 418—419; Ripley (*in* Mayr *et* Paynter), 1964, 10:88; Étchépar, 1983, 168—169; 郑作新等, 1983, 216—217; de Schauensee, 1984, 353—354; Ali *et* Ripley, 1987, 582—583; 郑作新, 1987, 608—609.

XI. 宽嘴鹎属 *Cochoa* Hodgson, 1836

形态 鼻孔大、裸露, 呈椭圆形; 嘴短而特宽阔, 因而称为宽嘴鹎, 嘴须不著; 翅形长尖, 第1枚初级飞羽甚短; 尾羽长度适中, 略呈凸尾状; 跗蹠短而强壮。雌雄两性不同。

地理分布 本属计有3种, 除 *Cochoa azurea* 仅分布于印度尼西亚外, 其余2种在国内见于福建, 四川, 贵州, 云南。在国外则广泛分布于我国南疆诸邻国及印度尼西亚。

Cochoa Hodgson, 1836, Journ. As. Soc. Bengal 5:359. 模式种: *C. purpurea* Hodgson.

参阅: Baker, 1924, 2:183—186; Smythies, 1953, 134—135; Ripley (*in* Mayr *et* Paynter), 1964, 88—89; 郑作新, 1966, 124; Ali *et* Ripley, 1973, 9:16—20; 郑作新, 1987, 609—610; 彭燕章等, 1987, 265—266.

宽嘴鹎属 *Cochoa* 分种检索

头顶淡紫蓝色……………紫宽嘴鹎 *C. purpurea* (113)
 头顶深钴蓝色……………绿宽嘴鹎 *C. viridis* (113)