

(5) 藏西亚种 *Luscinia svecica abbotti* (Richmond)

曾于 8 月 14 日采得一只雌鸟,形态见前。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♀(1)	18	135	12	67	51	24

Vaurie(1959)认为这个亚种嘴峰一般较长,有的长达 17.5 毫米,但未注明什么性别。

Cynaecula abbotti Richmond, 1896, Proc. U. S. Nat. Mus. 18:184 (模式产地: Ladak).

生态 性隐怯,常遇见它在地面上作短距离奔驰;稍停,就向上举起尾羽,扩展一下,而后又向前疾走,或潜匿于芦苇或低矮灌木丛间。飞行很低,往往由一个灌木丛急飞至附近的另一丛里。它栖在底枝上,也不时扭动或扩展尾羽,犹如红尾鹟一样。

此鸟的食物主要为昆虫。郑作新等(1958)于 1953 年 5 月在河北昌黎剖析 1 只鸟胃,内全为象甲科昆虫。

繁殖在北方。赵正阶等(1985)在长白山夏间多次见到,可是未曾采到鸟巢和卵。据 Baker (1924),巢以杂草、叶、根等筑成,内铺以更细的草和兽毛残羽等,置于灌木丛或草丛中的地面稍凹处。每窝产卵 4—6 枚,呈淡绿色或橄榄褐色,在卵的钝端有时更缀以暗褐色泽或斑纹。

经济意义 嗜食昆虫,对农林有益。又因善于歌咏,常被饲于鸟笼里或木架上,供观赏用。

Motacilla svecica Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 187 (模式产地: 欧洲北部 Lapland).

Cyanosylvia svecica, Baker, 1924, 83—86.

Luscinia svecica Dementiev 等, 1954, 599—609; 郑作新, 1958, 126—127; Vaurie, 1959, 381—385; 钱燕文等, 1965, 117—118; 1980, 252; 彭燕章等, 1983, 205; 傅桐生等, 1984, 292—293; Flint 等, 1984, 231; 赵正阶等, 1985, 273—275; 郑作新, 1987, 579—581; 诸葛阳等, 1990, 328—329; 王香亭等, 1990, 398—399.

Erithacus svecicus Ripley (in Mayr et Paynter), 1964, 42—44; de Schauensee, 1984, 345; 蔡其侃, 1987, 439—441; Ali et Ripley, 1987, 565—566.

Erithacus (Luscinia) svecicus, Étchécopar et Hue, 1983, 135—137.

10. 黑胸歌鹟 *Luscinia pectoralis* (Gould) (图版 I, 图 1)

别名 西藏红点颏。

英文名 Himalayan Rubythroat.

地理分布 繁殖在新疆西部及天山,甘肃北部和西北部,青海东部和南部,四川北部和西部,西藏南部,及云南西北部。在国外,见于巴基斯坦,印度,喜马拉雅山脉各国以至缅甸北部。

鉴别特征 体形与红点颏相似。雄鸟的颏喉部赤红,胸有黑色的宽阔横带,非常显眼,与红点颏易区别;雌鸟的颏喉部白,胸淡灰褐,一般羽色与红点颏相似,但上体为橄榄褐色。