

*Tarsiger chrysaeus* Hodgson, 1845, Proc. Zool. Soc. London 13: 28 (模式产地: 尼泊尔); Baker, 1924, 95—96; 郑作新, 1958, 131; Vaurie, 1959, 392; 郑作新等, 1973, 148; 昆明动物研究所, 1980, 148; 彭燕章等, 1980, 223—224; 郑作新, 1987, 587.

*Erythacus chrysaeus* Ripley (in Mayr and Paynter), 1964, 48; Étchécopar et Hue, 1983, 143—144; de Schauensee, 1984, 347; Ali and Ripley, 1987, 569.

### 18. 棕腹林鵙 *Tarsiger hyperythrus* (Blyth)

英文名 Rufous-bellied Blue Robin.

**地理分布** 见于西藏东南部, 东抵云南省西北部怒江和澜沧江流域(海拔1950—3200米)。国外分布于尼泊尔, 不丹以及印度和缅甸的北部等。

**鉴别特征** 雄鸟上蓝下棕; 雌鸟上体大都橄榄褐, 下体黄褐。

**形态** (据昆明动物研究所, 1980)

雄性成鸟: 前额、眉纹、翅上的小覆羽及尾上覆羽等概辉钴蓝色; 头顶、后颈、胸的两侧以及上体余部包括两翅和尾的表面, 均深紫蓝色; 眼先以至耳羽黑而沾蓝色; 下体除肛周和尾下覆羽纯为白色外, 概辉棕栗色。

雌性成鸟: 上体暗橄榄褐, 腰和尾上覆羽灰蓝, 尾羽暗褐, 具蓝色外缘; 头侧、颈侧、胸侧及两胁等均黄橄榄, 颊、喉及胸等黄褐, 胸部的褐色较浓些; 腹部及尾下覆羽纯白。

**量衡度** (据昆明动物研究所):

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(6)	12.1 (11—13)	129.3 (120—137)	10.7 (9—13)	76.5 (74—78)	57.3 (53—63)	24.6 (24—25)
♀♀(2)	11,12	120,125	12,13	71,72	53,58	25,25

虹膜褐色; 嘴黑; 脚黑褐色。

**生态** 栖于高山沟谷(在云南高黎贡山地区, 海拔为1950—3200米)低处常绿阔叶林下的灌丛, 或稀树草地的杜鹃丛间, 急速地从灌丛的顶枝跳到另一枝上, 觅食小昆虫。繁殖习性未悉。

*Ianthia hyperythrus* Blyth, 1847, Journ. As. Soc. Bengal 16: 132 (模式产地: 印度 Darjeeling); Baker, 1924, 103—104.

*Tarsiger hyperythrus* Vaurie, 1959, 391; 郑作新, 1976, 548; 昆明动物研究所, 1980, 149; 彭燕章等, 1980, 256—7; 郑作新, 1987, 588.

*Erythacus hyperythrus* Ripley (in Mayr and Paynter) 1964, 49; Étchécopar et Hue, 1983, 145—146; de Schauensee, 1984, 347; Ali and Ripley, 1987, 650.

### 19. 白眉林鵙 *Tarsiger indicus* (Vieillot)

**别名** 白眉树丛欧鵙。

英文名 White-browed Bush Robin.

**地理分布** 见于四川东北部南充、灌县至西南部, 云南西北部丽江山脉及怒江与澜沧江间山脉, 西藏东南部通麦以及台湾2300米以上的山地。国外见于印度东北部, 尼泊尔, 不丹, 东至缅甸与越南北部。