

此鸟分布西在西藏和南疆诸邻国的北部,东则仅见于台湾省的高山,这样的不连续分布,对于古地理学,是很值得探讨的问题。

鉴别特征 雄鸟上蓝下棕。雌鸟上体橄榄褐,下体淡黄褐。雌雄两性均具白色眉纹,而在雄鸟更为显著。

形态 (依据西藏东南部通麦所采的标本)

雄性成鸟: 上体灰蓝色;头和颈部的两侧近黑;自额至枕有一宽阔的眉纹;两翅的内侧覆羽与背同色,外侧覆羽以及飞羽均褐,而外缘以金棕色;尾黑,外翮沾蓝;下体橙棕色,在胸特显著;腹部中央、肛周及尾下覆羽近白。

雌性成鸟: 上体暗橄榄褐色,腰羽微带淡黄色;白色眉纹不显,眼周有淡黄色一圈;头和颈等的两侧均褐,而杂以赭色;两翅及尾褐,而外缘以橄榄色;下体暗棕赭色,向后渐淡。

虹膜褐色;嘴黑;脚和趾均角褐色。

量衡度(据云南宾川所采的 *T. i. yunnanensis* 标本):

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	15	141	12	76	68	28
♀(1)	14	145	12	74	70	26

分类讨论 本种分为三个亚种,均见于中国。

亚种检索 (♂)

1. 额和头顶均淡蓝色2
- 额与头顶均石板黑色;下体绿褐色 台湾亚种 *T. i. formosanus* (56)
2. 下体橙棕色,在胸特著;尾下覆羽近白 指名亚种 *T. i. indicus* (55)
- 下体较多黄色;尾下覆羽近绿 西南亚种 *T. i. yunnanensis* (55)

(1) 指名亚种 *Tarsiger indicus indicus* (Vieillot)

见于我国西藏东南部通麦。国外分布于尼泊尔,不丹以及印度北部山地。

形态描述见前。

量衡度 (据 Baker, 1924):

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂	(1)14 (从头骨量起)	79—84	64—72	(1)26
♀♀		73—79	—	—

Sylvia indica Vieillot, 1817, Dict. Nat. Hist., nouv. ed., 11:263 (模式产地: 印度 Darjeeling).

(2) 西南亚种 *Tarsiger indicus yunnanensis* Rothschild

分布于四川东北部至西南部,云南丽江及怒江与澜沧江间山脉。国外仅在冬时见于缅甸和越南的极北部。