

## 亚种检索

1. 翅上有白斑;耳羽深栗褐,中贯以淡橙色纵纹 ..... 2  
翅上无白斑;耳羽纯橙棕色 ..... 云南亚种 *Zoothera c. innotota* (161)
2. 体形较大;♂翅长达 125 毫米 ..... 安徽亚种 *Z. c. courtoisi* (161)  
体形较小;♂翅长不及 115 毫米 ..... 海南亚种 *Z. c. aurimaculc* (162)  
体形适中;♂翅长 115—121 毫米 ..... 两广亚种 *Z. c. melli* (162)

(1) 云南亚种 *Zoothera citrina innotota* Blyth

分布于云南潞西、勐养、盈江和永善。国外见于缅甸,泰国,老挝,柬埔寨,越南和马来西亚等。

形态和量衡度见种的描述。

*Geocichla innotota (sic)* Blyth, 1846, Journ. As. Soc. Bengal 15:370 (模式产地: 印度 Nicobar Is. 及马来亚)。

(2) 安徽亚种 *Zoothera citrina courtoisi* (Hartert)

是我国特有亚种,仅见于安徽霍山和湖北宜都。

与 *Z. c. innotota* 对比,体形较大,雄鸟翅长达 125 毫米。

雄性成鸟: 头顶、颈及颈侧橙栗色,头顶羽色较深且微染橄榄色;耳羽栗褐色,中贯以淡栗色纵纹;背、腰、尾上覆羽呈蓝灰色;飞羽外翮蓝灰,内翮黑褐;大覆羽外翮羽端缀白,中覆羽羽端具大形白斑。颏、喉、胸及两胁橙栗;喉侧具栗褐色颧纹或斑点;肛周及尾下覆羽白色。

雌性成鸟: 前额、头顶、颈及颈侧和喉、胸和两胁与雄鸟相似,呈橙栗色;肛周和尾下覆羽亦与雄鸟相同,为白色;但背、腰和尾上覆羽以及飞羽和翼上覆羽等则为橄榄褐色,其中覆羽白斑较雄鸟稍大。

采自安徽的雄鸟标本与湖北宜都标本对比,其翼上覆羽的白斑较大而明显。

幼鸟(♂,采自湖北宜都的标本) 前额、头顶、颈和颈侧褐黄色,各羽羽干皮黄色;背、腰及尾上覆羽暗褐,染以橄榄色,背部各羽具明显的黄白色羽干纹;飞羽呈蓝灰色;尾暗褐沾蓝灰色。颏、喉淡黄白色;颧纹黑褐色;胸、上腹及两胁皮黄或橙黄,缀以暗褐斑纹;下腹及尾下覆羽与成鸟相同,均为白色。

## 量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	63.5	189—222	19.4—20.1	125—130	75—83	32.2—35.5
♀(1)	—	175	188	110	67	30.2
♂(1幼)	54	189	17.5	116	71	31.4

*Turdus citrina courtoisi* Hartert, 1919, Bull. Brit. Orn. Cl. 40:52 (模式产地: 安徽霍山)。