

黄至污白色;尾下覆羽暗褐,具大形白色羽端斑;腋羽白色,羽端暗褐。

量衡度:

性别	体重	体长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
	67.8	215	18.6	120.6	84.6	31.3
♂♂(5)	(60—71)	(206—219)	(18.1—19.3)	(118—127)	(79—89)	(29.8—34.7)
	72.4(4)	224.2	18.7	118.2	30.5	29.8
♀♀(5)	(65—90)	(219—234)	(17—21)	(117—126)	(67—84)	(27—31)

亚种分化 本种计有 2 个亚种,均见于我国。

亚种检索

- 体色较淡;腹部杂有白色……………指名亚种 *Zoothera s. sibirica* (165)
 体色较暗;腹部纯石板灰色……………华南亚种 *Z. s. davisoni* (165)

(1) 指名亚种 *Zoothera sibirica sibirica* (Pallas)

国内分布于黑龙江,吉林,辽宁及内蒙古呼伦贝尔盟(繁殖鸟),甘肃西南部,陕西南部及西安,北京,河北,河南,山东,江苏,贵州,四川,湖南,福建西部,广东,广西和海南(旅鸟,冬候鸟)。国外见于西伯利亚,蒙古东北部,朝鲜,日本,越南,泰国,老挝,柬埔寨,印度,马来西亚和印度尼西亚。

形态和量衡度见种的描述。

Turdus sibiricus Pallas, 1776, Reise versch. Prov. Russ. Reichs 3: 694(模式产地: 西伯利亚的达乌尔地区)。

(2) 华南亚种 *Zoothera sibirica davisoni* (Hume)

国内见于江苏沙卫山岛,福建西北部,贵州,广西(旅鸟)。国外分布于日本,越南,缅甸,马来西亚和印度尼西亚。

与 *Z. s. sibirica* 相似,但羽色较黑;尾下覆羽不具白色羽端;腹部和尾下覆羽的端部为石板灰色。

雌性幼鸟(依据采自福建的标本): 头和上背橄榄褐色;眉纹黄色缀以黑纹;耳羽棕黄,具暗褐色羽端;下背和尾上覆羽橄榄灰;大覆羽橄榄棕,具黄褐色羽端斑;飞羽外翮橄榄褐色,内翮黑褐色;尾羽黑褐染灰,最外侧一对尾羽具白色羽端。下体: 颈、喉黄褐色,胸棕白具黑褐色横斑,两胁橄榄褐色,腹部中央白色;尾下覆羽暗褐,具大的白色羽端。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
2♀(幼)	62	220,241	16.8,18.1	118,127	91,98	29.1,30.0

Turdulus Davisoni Hume, 1877, Str. Feath. 5:63 (模式产地: Mt. Mooleyit, Tenasserim)。

白眉地鶇主要栖息于混交林和针叶林。迁徙期间常在林缘、道旁两侧次生林,甚至还在村庄附近的丛林中活动。平时在地面上走走停停,边走边觅食,主要食物为昆虫,是一