

带浅灰色，此色延伸到上胸；体侧棕褐色，腹部中央白色；尾下覆羽灰棕褐色，末端略白；腋羽与胸侧相似。雌雄相似。

虹膜橄榄黄色；嘴峰铅褐色，下嘴褐黄色；跗蹠灰褐色。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂(3)	33—39	205—234	15—16	81—86	114—122	30—33
♀ ♀(8)	31—35	199—220	15—17	83—87	112—201	29—30

亚种分化 本种有 4 个亚种，见于我国的仅有 2 个亚种。

亚 种 检 索

- 前额栗色较暗；背部棕褐色 指名亚种 *A. e. egertoni*
前额栗色较淡；背部、腰部和尾上覆羽橄榄褐色 云南亚种 *A. e. ripponi*

(1) 指名亚种 *Actinodura egertoni egertoni* Gould

见于西藏东南部；在国外，分布于尼泊尔，锡金，不丹及印度阿萨姆。

本亚种与 *A. e. ripponi* 十分相似，但前额栗色较暗，背部、腰部和尾上覆羽均为棕褐色，各部羽色较后者略浓。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂(1)	33	217	16.5	81	113	28
♀ ♀(2)	32	211—215	16—17	80—81	85—115	27—28
♀(1)	33	198	16	83	107	32

Actinodura egertoni Gould, 1836, Proc. Zool. Soc. London: 18 (模式产地：尼泊尔)。

Actinodura egertoni egertoni, Baker, 1922, 1:303—304; Ali et Ripley, 1972, 7:83—84.

(2) 云南亚种 *Actinodura egertoni ripponi* Ogilvie-Grant et La Touche

分布于云南西部；在国外，仅见于缅甸。

本亚种与指名亚种十分相似，与之区别的在于背部、腰部和尾上覆羽为橄榄褐色；体色较指名亚种略淡。

量衡度见种的量度。

Actinodura ripponi Ogilvie-Grant et La Touche, 1970, Ibis (9): 186 (模式产地：缅甸 Mt. Victoria, Chin Hill)。

Actinodura egertoni ripponi, Baker, 1922, 1:305; Ali et Ripley, 1972, 7:85—86; 中国科学院昆明动物研究所 1980, 197—198。

生态 一般集 6—12 只小群或与其他小鸟混群，常活动于茂密的灌丛或矮树、灌木间，偶尔也觅食或攀缘在较高的树顶或树干上的缝隙间，有时还在小树枝上扑动翅膀。当受惊时，疾速下降到树下灌丛中。繁殖季节成对活动。食物以昆虫为主，也吃一些无花果、浆果和种子等。

Actinodura egertoni Gould, 1836, Proc. Zool. Soc. London: 18 (模式产地：尼泊尔); Deignan (in Mayr et Paynter), 1964, 391; 郑作新, 1976, 665—666。