

亚种检索

头顶暗褐色，耳羽淡色而有白色条纹，下体灰色 昌都亚种 *A. w. daflaensis*
头顶黑蓝灰色，耳羽深银灰色，下体深栗棕色 云南亚种 *A. w. saturator*

(1) 昌都亚种 *Actinodura waldeni daflaensis* Godwin-Austen

国内见于西藏东南部；在国外，分布于印度阿萨姆。

冠羽暗褐色，边缘淡色，耳羽淡色，有白色条纹；下体灰色，喉和胸部具棕褐色条纹。

Actinodura daflaensis Godwin-Austen, 1875, Ann. Mag. Nat. Hist. 16:340 (模式产地：印度阿萨姆邦达夫拉山)。

(2) 云南亚种 *Actinodura waldeni saturator* (Rothschild)

国内见于云南西部；在国外，仅分布于缅甸。

头部黑蓝灰色，羽缘银灰色，形成披针形花纹的羽冠；耳羽深银灰色；下体深栗棕色，羽毛边缘沾朦胧的锈黄色。

Ixops poliotis saturator Rothschild, 1921, Nov. Zool. 28:38 (模式产地：云南西北部怒江和龙川江间山脉)。

生态 此鸟是当地的常见留鸟，活动于苔藓和常绿树的混交林中；通常攀缘于丛生苔藓的树干上，寻食隐藏在苔藓下的昆虫；行动缓慢，多在中等高度的树下活动，灌丛下很少见到。大都以花蕾、花蜜、浆果、苔藓、昆虫及软体动物等为食。

Actinodura waldeni Godwin-Austen, 1874, Proc. Zool. Soc. London: 46, 图版12 (模式产地：印度阿萨姆邦 Naga Hills); Deignan (in Mayr *et* Paynter), 1964, 392—393; Ali *et* Ripley, 1972, 88—89; 郑作新, 1976, 667—668。

80. 灰头斑翅鹛 *Actinodura souliei* Oustalet (图版六：5)

英名：Soule's Barwing

地理分布 四川中部、云南西部及东南部；在国外，仅见于越南北部。

鉴别特征 前额到头顶棕色，具深巧克力色条纹；后颈近灰色，羽毛边缘浅黑色；眼先黑色；耳羽银灰色；背部沙黄色向尾部渐变为红棕色，但均具深巧克力色条纹；翅红棕色，具黑色横斑；尾羽与翅相似，末端白色；下体从浅棕色到红棕色且均具不等密度的巧克力色条纹。两性相似。

形态 (依据指名亚种的标本) 前额到头顶巧克力色，羽毛边缘浅棕色；后颈灰色，羽轴和羽缘浅黄色，内外羽片淡黑色似灰；眼先黑色；耳羽银灰色；上背巧克力色，而羽毛边缘具较宽的浅豆沙黄色；上体其余部分红棕色，羽毛中央略见大小不等的深巧克力色，构成翥部和上体的深色条纹；翅上覆羽与背部同色，但中央部分的巧克力色面积较大；小翼羽和初级覆羽灰褐色，并具明显的黑色宽斑；大覆羽浅棕色，外翮边缘浅灰色，并具棕色横斑；飞羽暗灰褐色，最外侧数枚初级飞羽外翮浅灰色，其余初级飞羽外翮红棕色，其上具