

3. 脚角色, 少黄色 4
 脚呈黄色 6
4. 头褐色, 而富灰色 滇东亚种 *A. m. schaefferi*
 头少灰色 5
5. 无眉纹, 上体染棕红 湖北亚种 *A. m. davidi*
 有不明眉纹, 上体几为棕红 东南亚种 *A. m. hueti*
6. 头顶多灰, 下背富橄榄褐 海南亚种 *A. m. rufescentior*
 头顶多褐, 下背多棕色 指名亚种 *A. m. morrisonia*

(1) 湖北亚种 *Alcippe morrisonia davidi* Styan

分布于甘肃中部黄土高原天水北, 陕西秦岭南坡西乡、泽县, 四川中部宝兴、雅安、灌县、成都、峨眉、乐山、峨边、甘洛、马边、南部屏山、宜宾、重庆、南川、凉山、东北部南江、万源、东部南充、忠县、东南部秀山, 贵州西北部赤水、习水、北部绥阳、中部贵阳、都匀、雷山、东北部印江、江口、东南部榕江, 湖南西北部沅陵、北部常德、东北部平江、浏阳、西部新化、东部醴陵、衡山、莱阳、西南部会同, 福建东部福清, 云南东北部盐津、绥江等地。不见于国外。

与 *A. m. hueti* 相较, 头和后颈多褐色, 没有侧冠纹, 背和腰亦较富于褐色而少棕红色渲染, 胁部多橄榄色。*A. m. yunnanensis* 嘴浅角褐色。*A. m. schaefferi* 头部褐色少, 而富灰色。11月采自云南东北部盐津的 1 鸟, 头部深灰染褐, 与云南东南部的 *A. m. schaefferi* 相似, 但上体橄榄色与 *A. m. davidi* 相仿。

虹膜暗褐; 嘴黑; 脚浅角色。

量衡度:

性 别	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂ (10)	10.7	64.4	57.5	21.4
	(10—11.5)	(61.5—66.5)	(55—60)	(20—23)
♀♀ (10)	10.6	64.2	57.7	21.4
	(10—11.5)	(60.5—66)	(52.5—62.5)	(20—22)

Alcippe davidi Styan, 1896, *Ibis* (7) 2: 310 (模式产地: 湖北宜昌): *nom. nov. tor*:

Alcippe cinerea David, 1871, *Bull. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris* 7: 8, 14 (模式产地: 四川宝兴): *nec* of Blyth, 1844.

(2) 云南亚种 *Alcippe morrisonia fraterculus* Rippon

分布于云南西北部贡山、西部泸水、腾冲、盈江、龙陵、潞西、营盘、凤庆、镇康、临沧、景东、南部思茅、西双版纳; 在国外, 分布在缅甸掸邦, 老挝北部, 泰国北部。

嘴角褐, 与 *A. m. yunnanensis* 相似, 但下体较 *A. m. yunnanensis* 多皮黄色, 上体少橄榄黄而多橄榄色。其他亚种嘴黑褐而非角褐色或黄褐色。

1983年6月16日采自云南南部西双版纳的 1 只幼鸟(♀), 翅、尾已长全, 喉、胸部羽毛尚呈绒状, 上体橄榄灰褐, 头侧灰色染浅皮黄, 喉部近白, 微缀以浅皮黄, 下体浅皮黄色, 腹部中央近白。