

3. 脚角色, 少黄色	4
脚呈黄色	6
4. 头褐色, 而富灰色	滇东亚种 <i>A. m. schaefferi</i>
头少灰色	5
5. 无眉纹, 上体染棕红	湖北亚种 <i>A. m. davidi</i>
有不明显眉纹, 上体几为棕红	东南亚种 <i>A. m. hueti</i>
6. 头顶多灰, 下背富橄榄褐	海南亚种 <i>A. m. rufescens</i>
头顶多褐, 下背多棕色	指名亚种 <i>A. m. morrisonia</i>

(1) 湖北亚种 *Alcippe morrisomia davidi* Styani

分布于甘肃中部黄土高原天水北, 陕西秦岭南坡西乡、泽县, 四川中部宝兴、雅安、灌县、成都、峨眉、乐山、峨边、甘洛、马边、南部屏山、宜宾、重庆、南川、凉山、东北部南江、万源、东部南充、忠县、东南部秀山, 贵州西北部赤水、习水、北部绥阳、中部贵阳、都匀、雷山、东北部印江、江口、东南部榕江, 湖西南西北部沅陵、北部常德、东北部平江、浏阳、西部新化、东部醴陵、衡山、莱阳、西南部会同, 福建东部福清, 云南东北部盐津、绥江等地。不见于国外。

与 *A. m. hueti* 相较, 头和后颈多褐色, 没有侧冠纹, 背和腰亦较富于褐色而少棕红色渲染, 肋部多橄榄色。*A. m. yunnanensis* 嘴浅角褐色。*A. m. schaefferi* 头部褐色少, 而富灰色。11月采自云南东北部盐津的1鸟, 头部深灰染褐, 与云南东南部的 *A. m. schaefferi* 相似, 但上体橄榄色与 *A. m. davidi* 相仿。

虹膜暗褐; 嘴黑; 脚浅角色。

量衡度:

性 别	嘴 峰	翅	尾	跗 跟
♂♂(10)	10.7 (10—11.5)	64.4 (61.5—66.5)	57.5 (55—60)	21.4 (20—23)
♀♀(10)	10.6 (10—11.5)	64.2 (60.5—66)	57.7 (52.5—62.5)	21.4 (20—22)

Alcippe davidi Styani, 1896, Ibis (7) 2:310 (模式产地: 湖北宜昌); nom. nov. tor;

Alcippe cinerea David, 1871, Bull. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 7: 8, 14 (模式产地: 四川宝兴); nec of Blyth, 1844.

(2) 云南亚种 *Alcippe morrisomia fraterculus* Rippon

分布于云南西北部贡山、西部泸水、腾冲、盈江、龙陵、潞西、营盘、凤庆、镇康、临沧、景东、南部思茅、西双版纳; 在国外, 分布在缅甸掸邦, 老挝北部, 泰国北部。

嘴角褐, 与 *A. m. yunnanensis* 相似, 但下体较 *A. m. yunnanensis* 多皮黄色, 上体少橄榄黄而多橄榄色。其他亚种嘴黑褐而非角褐色或黄褐色。

1983年6月16日采自云南南部西双版纳的1只幼鸟(♀)翅、尾已长全, 喉、胸部羽毛尚呈绒状, 上体橄榄灰褐, 头侧灰色染浅皮黄, 喉部近白, 微缀以浅皮黄, 下体浅皮黄色, 腹部中央近白。

虹膜棕红；嘴黄褐或角褐色，下嘴较淡；脚淡角褐色。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 跖
♂ ♂(18)	15.3*	140.8*	12.2	62.9	62.7	21.6
	(14—19)	(131—149)	(9—12)	(60—67)	(57—71)	(20—25)
♀ ♀(14)	14.6*	139.7*	10.8	60.6	60.1	21.7
	(12—18)	(131—156)	(10—12.5)	(58—63.5)	(56—68)	(20—24)

Alcippe fratercula Rippon, 1900, Bull. Brit. Orn. Cl. 11:11 (模式产地：缅甸掸邦)。

(3) 滇西亚种 *Alcippe morrisonia yunnanensis* Harington

分布于四川南部凉山、木里、米易、南部南川，云南西北部贡山、西部泸水、中部大理附近；在国外，分布在缅甸东北部。

与 *A. m. fraterculus* 相似，嘴角褐色，但下体富于橄榄色而少皮黄色，上体多橄榄黄而少橄榄色渲染。其亚种嘴均黑褐而非角褐色。

虹膜褐色或赭红色；上嘴黑，下嘴石板色或角色；脚浅角色或角色。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 跖
♂ ♂(7)	15	130	10.6	66.3	66.0	21.0
	15.5, 16	135, 145	(10—11)	(64—68.5)	(64.5—68.5)	(20—22)
♀ ♀(4)	14	124	10, 10	60, 60.5	60.5, 61.5	21, 21
	14, 14.5	130, 132	11, 11.5	64, 67	64, 66.5	22, 22.5

Alcippe fratercula yunnanensis Harington, 1913, Bull. Brit. Orn. Cl. 11:63 (模式产地：云南大理以东点苍山)。

(4) 滇东亚种 *Alcippe morrisonia schaefferi* La Touche

分布于云南东南部屏边、河口、富宁，贵州西南部册亨、望谟，广西瑶山地区金秀老山；在国外，分布在越南北部和中部。

与 *A. m. hueti* 相较，头稍多暗灰而少褐色，头侧亦较富于灰色的渲染，喉部具皮黄色，上体少棕红色渲染，下体两侧富赭色，少茶黄色，与后者的头部多有褐色，头部两侧少灰色，喉部少皮黄色，上体多棕红，下体两侧富茶黄色。嘴黑褐，不同于 *A. m. fraterculus* 和 *A. m. yunnanensis* 下嘴之为浅角褐。*A. m. davidi* 头颈部多褐色。

10月采自瑶山地区金秀老山的标本，头颈纯深灰色。繁殖季节采自云南河口、富宁的头部和颈部呈现深灰染褐。金秀的标本上体羽色与云南东南部的 *A. m. schaefferi* 相似，暂列为本亚种。

虹膜暗褐；嘴黑褐；脚浅角色。

量衡度：

6号标本的平均值。