

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
	12.80	124.0	9.0	59.2	56.2	22.4
♂♂(5)	(10—20)	(118—136)	(9—9)	(57—64)	(53—59)	(22—24)
♀♀(2)	10,12	106,107	9,9	53,56	53,59	22,23

*Siva vinipectus* Hodgson, 1938, Ind. Rev.:29 (模式产地: 尼泊尔)。

### (2) 藏南亚种 *Alcippe vinipectus chumbiensis* (Kinnear)

见于西藏珠穆朗玛峰地区樟木、西乡、南部亚东春丕河谷；在国外，分布于尼泊尔东部至锡金和不丹。

耳羽棕褐；头部渲染棕褐，与 *A. v. perstriata* 和 *A. v. bieti* 相区别。喉、胸部纵纹不如 *A. v. perstriata* 明显；*A. v. chumbiensis* 腰茶黄色浓，*A. v. bieti* 腰茶黄色浅。指名亚种喉近白，无纵纹。

虹膜黄白；嘴黑，下嘴基部粉色；脚浅褐色。

量衡度：

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
	8,8.5	53,5	50	23
♂♂(3)	9	56,59	53.5,55	24,25
♀♀(7)	8.36	56.93	52,64	23.43
	(8—9)	(55—60.5)	(49—59)	(22—24)

*Fulvetta vinipectus chumbiensis* Kinnear, 1939, Ibis(14)3:751 (模式产地: 西藏南部亚东)。

### (3) 滇西亚种 *Alcippe vinipectus perstriata* (Mayr)

分布于云南西北部贡山、西部泸水、腾冲、怒江与龙川江间山脉；西藏东南部芒康的标本为 *A. v. perstriata* 与 *A. v. bieti* 的居间类型。在国外，分布于缅甸克钦州。

与 *A. v. chumbiensis* 相似，喉胸有纵纹，但本亚种耳羽黑色，与后者以及指名亚种之为暗棕褐不同，本亚种胸部暗浓，带葡萄灰，下体两侧赭茶黄，下背、腰和翅表多锈红色，上背褐色沾红，头呈棕红褐色，与 *A. v. bieti* 的胸近白，下体浅淡稍染茶黄，腰和翅表茶黄色，上背橄榄灰褐，头呈灰褐色等，均不相同。

高山雀鹛(*A. striaticollis*) 下体与本亚种相似，但上体没有茶黄色，没有白眼纹和黑色侧冠纹，颊和耳羽非黑色。

虹膜灰白；嘴黑；脚褐色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
	9.67	121.7	8.6	53.6	52.5	21.5
♂♂(6)	(9—11)	(115—130)	(8—10)	(49—56)	(53—55)	(20—22)
♀♀(6)	10.40*	120.2	8.7	55.5	55.2	21.7
	(10—12)	(116—127)	(8—10)	(54—59)	(53—57)	(20—23)

*Fulvetta vinipectus perstriata* Mayr, 1941, Ibis (14) 5: 79 (模式产地: 云南西部中缅交界地的 Chawngmawhka)。

*Alcippe vinipectus perstriata*, 中国科学院昆明动物研究所, 1980, 203。