

亚 种 检 索

羽色稍深；体形较小，♂♀翅长 134(130—138) 毫米，嘴峰 36(34—40) 毫米 (Vaurie, 1959)
..... 指名亚种 *B. w. waddelli*
羽色稍浅淡；体形较大，♂♀翅长 139.7(132—145)毫米，嘴峰 40.2(39—42)毫米 (Vaurie, 1959).....
..... 藏南亚种 *B. w. jomo*

(1) 指名亚种 *Babax waddelli waddelli* Dresser

分布于西藏南部日喀则、林周、拉萨、泽当、曲水、桑日、隆子、朗果、林芝、派区、三安曲林以及昌都地区西南部(留鸟)，在国外，见于锡金东北部 2,800—4,500 米海拔高度。

形态详见种的描述。

羽色较 *jomo* 深，体形小(见亚种检索)。Kinnear (1938) 以西藏南部 Le La 的标本嘴较短(2♂♂136—137, 2♀♀131—133 毫米)；上体羽色较深；下体纵纹浓暗，几呈黑褐色，羽缘较多灰，而无皮黄色渲染，订立为 *lumsdeni*。Vaurie (1955) 观察了西藏东南部和指名亚种的地模标本，发现西藏东南部的标本体羽仅较指名亚种稍深，提出此乃可能受西南部季风湿度大之影响而形成羽色稍深的现象。

Babax waddelli Dresser, 1905, Proc. Zool. Soc. London: 54 (模式产地：西藏雅鲁藏布江上曲水附近)。

Babax lanceolatus lumsdeni Kinnear, 1938, Bull. Brit. Orn. Cl. 58: 76 (模式产地：西藏南部 Le La, 在加玉宗 Chayul Dzong 和 Charme 之间)。

(2) 藏南亚种 *Babax waddelli jomo* Vaurie

分布于西藏江孜一带(留鸟)；未录自国外。

羽色较指名亚种浅淡，体形稍大(见亚种检索)。

Babax waddelli jomo Vaurie 1955, Amer. Mus. Novit. 1753:5 (模式产地：西藏江孜以南 6 公里处)。

生态 栖息习性与其他画眉亚科鸟类相同，营结群生活，多 5—6 只为群。性隐匿。常在针阔混交林中的下层灌丛、藪丛或农田边灌丛及小树间活动。以虫为食。

Babax waddelli Dresser, 1905, Proc. Zool. Soc. London: 54 (模式产地：西藏雅鲁藏布江上曲水附近)。

Babax waddelli, Baker, 1922, 1:189—190; Vaurie, 1959, 422—423; Deignan(*in* Mayr *et* Paynter) 1964, 10:347—348; 郑作新, 1976, 624; 郑作新等, 1983, 234—235。

29. 棕草鹛 *Babax koslowi* (Bianchi) (图版三: 2)

英名: Koslow's Babax

地理分布 青海、西藏(留鸟)，不见于国外。

鉴别特征 整个上体棕色，头和颈部较深，颈羽或具灰绿；耳羽与头略似，或具浅色纵纹；髭部和耳羽下方浅茶黄而具棕纹；下体灰色或微染茶黄色；胸部和体侧具明显(或不明显)的棕栗色纵纹；腹部中央大都纯色；尾下覆羽灰棕以至棕褐色。

形态(依据指名亚种的标本；采自青海杂多、昂久)雄鸟：自前头至枕浓棕褐色，羽端或浅；上体棕褐色较头部淡，羽缘微缀棕灰；腰羽转呈浅灰棕色；尾上覆羽呈棕色或棕栗